

REIKALAVIMAI ĖMINIŲ LAIKYMOUI, PRIIMTINUMUI IR ANALIZĖS TRUKMEI

PAAIŠKINIMAI:

* - Tyrimai siunčiami į Lietuvos PTL, tyrimų atlikimo laiką žiūrėti prie kiekvieno atskirai.

** - Tyrimai siunčiamų į Vokietiją, atlikimo laikas 10-20 d.d., kuris priklauso nuo tyrimo atlikimo sudėtingumo.

PASTABOS:

Pastaba 1. Išorės siuntėjų atvežtų tyrimų bei paskirtų rečiau atliekamų tyrimų rezultatai, nesant poreikiui gauti rezultatą skubos tvarka, pateikiami per 1 - 2 d.d. arba tam tikrą nustatytą savaitės dieną.

Pastaba 2. Iširti kraujo mėginiai (hematologiniai tyrimai) po rezultatų pateikimo saugomi 1 parą +2+8 °C temperatūroje, iširti kraujo mėginiai (biocheminiai, kraujo krešėjimo ir molekuliniai tyrimai) po tyrimo rezultatų pateikimo saugomi 2 paras +2+8 °C temperatūroje, 5 paras -20 °C temperatūroje.

Pastaba 3. **INFORMACIJA IŠORĖS SIUNTĖJAMS** - Visi mėginiai, kurie yra siunčiami į Vokietiją ir po centrifugavimo privalo būti šaldomi -20°C, turi būti atpilti į specialius tuščius mėgintuvėlius, kuriuos galite užsisakyti iš LDC.

Laboratorinės diagnostikos centro darbo laikas: I-V 8:00 – 20:00 val., VI 8:00-15:00

Ėminių priėmimas: I-V 8:00 – 19:30 val., VI 8:00-14:30

Ėminiai į papildomų tyrimų laboratorijas gabenami kiekvieną darbo dieną 12 val.

Į LDC laboratoriją mikrobiologiniai ėminiai turi būti pristatyti šeštadieniais iki 11 val., kad būtų išsiųsti papildomų tyrimų laboratorijai.

Jei ėminys yra pristatytas į laboratoriją likus mažiau nei 30 min. iki laboratorijos darbo pabaigos, tyrimo rezultatai bus pateikti bendrąja tvarka kitą darbo dieną.

Mokamų tyrimų kodas	Tyrimo pavadinimas	Atlikimo laikas (nuo ėminio pristatymo į laboratoriją)	Tiriamoji medžiaga (ėminio tipas), reikalingas kiekis	Laikymo sąlygos	Transportavimo sąlygos Lietuvoje (atsižvelgti į laikymo sąlygas)	Tyrimas atliekamas vidinėje HILA laboratorijoje (Taip/Ne)	Tyrimą atliekanti laboratorija (pildoma, kai tyrimą atlieka subrangovas)	Tyrimo metodas	Pastabos ir/ar papildomi reikalavimai
BIOCHEMINIAI TYRIMAI									
Angliavandeniai ir jų metabolizmo tyrimai									
LB09	Gliukozė (GLU)	2 val.	Plazma (NaF) arba Serumas. Serumo mėginiai turėtų būti atskiriami nuo ląstelių ar krešulio per pusvalandį nuo paėmimo, 1 ml	Serumas 8 val. +15 - (+25) °C 72 val. +2 - (+8) °C Plazma (NaF) 3 d. +15 - (+25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fotometrinis, heksokinazinis	Retais atvejais gamapatijos, ypač IgM (Waldenstromo makroglobulinemija) gali įtakoti rezultatus. Kai kraujas yra paimamas ir jam leidžiama sukrešėti ir stovėti necentrifuguotam kambario temperatūroje, vidutinis serumo gliukozės sumažėjimas yra ~7 % per 1 valandą (nuo 0.28 iki 0.56 mmol/L). Gliukozės mėginių stabilumas priklauso nuo laikymo temperatūros, bakterinio užterštumo ir glikolizės.
LB532	Gliukozės tolerancijos mėginys (gliukozė po 1 val.)	4 val.	Plazma (NaF) arba Serumas. Serumo mėginiai turėtų būti atskiriami nuo ląstelių ar krešulio per pusvalandį nuo paėmimo, 1 ml	Serumas 8 val. +15 - (+25) °C 72 val. +2 - (+8) °C Plazma (NaF) 3 d. +15 - (+25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fotometrinis, heksokinazinis	Retais atvejais gamapatijos, ypač IgM (Waldenstromo makroglobulinemija) gali įtakoti rezultatus. Kai kraujas yra paimamas ir jam leidžiama sukrešėti ir stovėti necentrifuguotam kambario temperatūroje, vidutinis serumo gliukozės sumažėjimas yra ~7 % per 1 valandą (nuo 0.28 iki 0.56 mmol/L) - Tris dienas prieš tyrimą nebadauti, suvartoti daugiau kaip 150 g angliavandenių per dieną ir užsiimti įprasta fizine veikla. - Nevalgyti 10 – 16 val. prieš tyrimą, galima gerti vandens. - 15 min. prieš tyrimą ir tyrimo metu nerūkyti. - Moterims nerekomenduojama atlikti šių tyrimų menstruacijų metu. - Kai kurie vaistai (gliukokortikoidai, estrogenai bei būklės (karščiavimas, ilgai trukęs lovos režimas) didina gliukozės kiekį kraujyje, todėl reikėtų gliukozės tolerancijos mėginį atlikti tuo metu, kai nėra šių veiksnų. Tyrimas skiriamas nėščiosioms.
LB533	Gliukozės tolerancijos mėginys (gliukozė po 2 val.)	4 val.	Plazma (NaF) arba Serumas. Serumo mėginiai turėtų būti atskiriami nuo ląstelių ar krešulio per pusvalandį nuo paėmimo, 1 ml	Serumas 8 val. +15 - (+25) °C 72 val. +2 - (+8) °C Plazma (NaF) 3 d. +15 - (+25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fotometrinis, heksokinazinis	Retais atvejais gamapatijos, ypač IgM (Waldenstromo makroglobulinemija) gali įtakoti rezultatus. Kai kraujas yra paimamas ir jam leidžiama sukrešėti ir stovėti necentrifuguotam kambario temperatūroje, vidutinis serumo gliukozės sumažėjimas yra ~7 % per 1 valandą (nuo 0.28 iki 0.56 mmol/L) - Tris dienas prieš tyrimą nebadauti, suvartoti daugiau kaip 150 g angliavandenių per dieną ir užsiimti įprasta fizine veikla. - Nevalgyti 10 – 16 val. prieš tyrimą, galima gerti vandens. - 15 min. prieš tyrimą ir tyrimo metu nerūkyti. - Moterims nerekomenduojama atlikti šių tyrimų menstruacijų metu. - Kai kurie vaistai (gliukokortikoidai, estrogenai bei būklės (karščiavimas, ilgai trukęs lovos režimas) didina gliukozės kiekį kraujyje, todėl reikėtų gliukozės tolerancijos mėginį atlikti tuo metu, kai nėra šių veiksnų.

LB651	Gliukozė prieš laktozės suvartojimą	2 val.	Plazma (NaF)	Plazma (NaF) 3 d. +15 - (+25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fotometrinis, heksokinazinis	Tris dienas prieš tyrimą nebadauti, suvartoti daugiau kaip 150 g angliavandenių per dieną ir užsiimti įprasta fizine veikla. - Nevalgyti 8 – 10 val. prieš tyrimą, galima gerti vandens. - 15 min. prieš tyrimą ir tyrimo metu nerūkyti. - Moterims nerekomenduojama atlikti šių tyrimų menstruacijų metu. - Kai kurie vaistai (gliukokortikoidai, estrogenai bei būklės (karščiavimas, ilgai trukęs lovos režimas) didina gliukozės kiekį kraujyje, todėl reikėtų gliukozės tolerancijos mėginį atlikti tuo metu, kai nėra šių veiksnių.
LB652	Gliukozė po laktozės suvartojimo (po 30 min.)	2 val.	Plazma (NaF)	Plazma (NaF) 3 d. +15 - (+25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fotometrinis, heksokinazinis	Tris dienas prieš tyrimą nebadauti, suvartoti daugiau kaip 150 g angliavandenių per dieną ir užsiimti įprasta fizine veikla. - Nevalgyti 8 – 10 val. prieš tyrimą, galima gerti vandens. - 15 min. prieš tyrimą ir tyrimo metu nerūkyti. - Moterims nerekomenduojama atlikti šių tyrimų menstruacijų metu. - Kai kurie vaistai (gliukokortikoidai, estrogenai bei būklės (karščiavimas, ilgai trukęs lovos režimas) didina gliukozės kiekį kraujyje, todėl reikėtų gliukozės tolerancijos mėginį atlikti tuo metu, kai nėra šių veiksnių.
LB653	Gliukozė po laktozės suvartojimo (po 60 min.)	2 val.	Plazma (NaF)	Plazma (NaF) 3 d. +15 - (+25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fotometrinis, heksokinazinis	Tris dienas prieš tyrimą nebadauti, suvartoti daugiau kaip 150 g angliavandenių per dieną ir užsiimti įprasta fizine veikla. - Nevalgyti 8 – 10 val. prieš tyrimą, galima gerti vandens. - 15 min. prieš tyrimą ir tyrimo metu nerūkyti. - Moterims nerekomenduojama atlikti šių tyrimų menstruacijų metu. - Kai kurie vaistai (gliukokortikoidai, estrogenai bei būklės (karščiavimas, ilgai trukęs lovos režimas) didina gliukozės kiekį kraujyje, todėl reikėtų gliukozės tolerancijos mėginį atlikti tuo metu, kai nėra šių veiksnių.
LB654	Gliukozė po laktozės suvartojimo (po 90 min.)	2 val.	Plazma (NaF)	Plazma (NaF) 3 d. +15 - (+25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fotometrinis, heksokinazinis	Tris dienas prieš tyrimą nebadauti, suvartoti daugiau kaip 150 g angliavandenių per dieną ir užsiimti įprasta fizine veikla. - Nevalgyti 8 – 10 val. prieš tyrimą, galima gerti vandens. - 15 min. prieš tyrimą ir tyrimo metu nerūkyti. - Moterims nerekomenduojama atlikti šių tyrimų menstruacijų metu. - Kai kurie vaistai (gliukokortikoidai, estrogenai bei būklės (karščiavimas, ilgai trukęs lovos režimas) didina gliukozės kiekį kraujyje, todėl reikėtų gliukozės tolerancijos mėginį atlikti tuo metu, kai nėra šių veiksnių.
LB10	Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c)	2 val.	EDTA kraujas, 2 ml	3 d. +15 - (+25) °C 7 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		Turbidimetrinės inhibicijos	Prieš atliekant tyrimą mėginį gerai sumaišykite.
VT996	Gliukagonas (GCG)**	20 d.d.	EDTA Plazma, 1 ml	1 mėn. -15 - (-20) °C	-20 °C	Ne	Vokietija Cottbus	RIA – radioimuninis tyrimas (radioimunologinis metodas)	- Kai kurie vaistai (gliukokortikoidai, estrogenai bei būklės (karščiavimas, ilgai trukęs lovos režimas) didina gliukozės kiekį kraujyje, todėl reikėtų gliukozės tolerancijos mėginį atlikti tuo metu, kai nėra šių veiksnių.
LF65	C-peptidas	7 d.d.	Serumas, 1 ml	4 val. +15 - (+25) °C 24 val. +2 - (+8) °C 30 d. -15 - (-20) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Atliekamas TREČIADIENIAIS Vengti hemolizės. Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val. Užšaldyti tik vieną kartą.
LF57	Insulinas	2 val.	Serumas, 1 ml	4 val. +20 - (+25) °C 48 val. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Hemolizė keičia tyrimo rezultatus.
VT100	Laktatai plazmoje*	14 d.d.	Plazma (NaF) (pilkas mėgintuvėlis), 2 ml	2 val. +2 - (+8) °C (Mėginys šaldytuve stabilus tik 2 valandas, todėl rekomenduojama mėginį nucentrifuguoti, plazmą atpilti ir užšaldyti) 6 mėn. - 15 - (-25) °C	-15...(-25) °C	Ne	VUL SK	Fermentinis	Imant kraują, stengtis, kad ranka būtų kuo mažiau suspausta, vengti hemolizės.
VT776	Fruktozaminas**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Fotometrinis	
VT470	Proinsulinas**	20 d.d.	EDTA Plazma, 1 ml	1 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	

LF85	Homeostazės modelis – rezistentiškumas insulinui (HOMA-IR)	2 val.	Serumas, 1 ml	8 val. +15 - (+25) °C 72 val. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Apskaičiuojamas pagal formulę	
Baltymai									
LB02	Albuminas (ALB)	2 val.	Serumas, 1 ml	2,5 mėn. +20 - (+25) °C 5 mėn. +4 - (+8) °C 4 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fotometrinis, bromkrezolio violetinio	Retais atvejais gamapatijos, ypač IgM (Waldenstromo makroglobulinemija) gali įtakoti rezultatus.
LB22	alfa1- antitripsinas (AAT) *	6 d.d.	Serumas, 1 ml	2 d. +2 - (+8) °C 30d. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK		
LB01	Bendras baltymas (TP)	2 val.	Serumas, 1 ml	6 d. +20 - (+25) °C 1 mėn. +4 - (+8) °C 12 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fotometrinis, biureto	Retais atvejais gamapatijos, ypač IgM (Waldenstromo makroglobulinemija) gali įtakoti rezultatus.
LB011	Bendras baltymas šlapime*	7 d.d.	Šlapimas, 50 ml	6 d. +20 - (+25) °C 7 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Kolorimetrinis	Gabenamas/pristatomas šaltai, 2-8 ° C temperatūroje, vienkartiname šlapimo inde.
LB012	Bendras baltymas paros šlapime*	7 d.d.	24 val. šlapimas, tyrimui atpilti 50 ml. Nurodyti paros šlapimo kiekį	6 d. +20 - (+25) °C 7 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Kolorimetrinis	Gabenamas/pristatomas šaltai, 2-8 ° C temperatūroje, šlapimas atpiltas į vienkartinį užsakamą šlapimo indelį.
VT60	beta2 mikroglobulinas* (Hodžkino limfoma, ne Hodžkino limfoma, plazmacitoma)	2 d.d.	Serumas, 1 ml	8 d. +2 - (+8) °C 12 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Imunologinis mikrodalelių tyrimas	Po centrifugavimo atskirtas į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo vienkartinį mėgintuvėlį kraujo serumas gabenamas/pristatomas šaltai, 2-8 ° C temperatūroje.
LB29	C reaktyvus baltymas (CRB)	2 val.	Serumas arba EDTA plazma, 1 ml	14 d. +15 - (+25) °C 3 sav. +2 - (+8) °C 12 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Dalelėmis sustiprintas imunoturbidimetris	Reikšmingai sumažėjusios CRB reikšmės gali būti gautos tiriant mėginius, paimtus iš pacientų, kurie buvo gydyti karboksipenicilinais. Labai retais atvejais gamapatijos, ypač IgM tipo (Waldenström makroglobulinemija), gali sąlygoti nepatikimus rezultatus
LB291	D.j. C reaktyvus baltymas (D.j. CRB)	2 val.	Serumas arba EDTA plazma, 1 ml	14 d. +15 - (+25) °C 28 d. +2 - (+8) °C 12 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Dalelėmis sustiprintas imunoturbidimetris	Retais atvejais gamapatijos, ypač IgM (Waldenstromo makroglobulinemija) gali įtakoti rezultatus. Reikšmingai sumažėjusios CRB reikšmės gali būti gautos tiriant mėginius, paimtus iš pacientų, kurie buvo gydyti karboksipenicilinais.
LB121	Cistatinas C (Cist C)	2 val.	Serumas, 1 ml	Serume: 7 d. +15 - (+25) °C 7 d. +2 - (+8) °C 24 mėn. -15 - (-25) °C Plazmoje: 7 d. +15 - (+25) °C 7 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Dalelėmis sustiprintas imunoturbidimetris	Kraujas, surinktas į kapiliarinio kraujo surinkimo mėgintuvėlius, netinka tirti. Labai retais atvejais gamapatija, ypač IgM tipo (Waldenstromo makroglobulinemija) gali sukelti nepriimtinius rezultatus.
LB54	Ceruloplazminas	7 d.d.	Serumas, 1 ml	8 d. +20 - (+25) °C 14 d. +4 - (+8) °C 1 metai -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Imunoturbidimetris	Labai retais atvejais gamapatijos, ypač IgM tipo (Waldenström makroglobulinemija), gali sąlygoti nepatikimus rezultatus.
LB341	Haptoglobinas*	2 d.d.	Serumas, 1 ml	7 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Imunologinis	Po centrifugavimo atskirtas į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo vienkartinį mėgintuvėlį kraujo serumas gabenamas/pristatomas šaltai, 2-8 ° C temperatūroje.
LF31	Imunoglobulinas E (IgE)	2 val.	Serumas, 1 ml	7 d. +20 - (+25) °C 7 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Nenaudokite mėginių, gautų iš pacientų, gydymų Xolair (omalizumabu) ar panašiais vaistais su anti-IgE antikūnais. Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val. Mėginius galima užšaldyti 5 kartus.
LB32	Imunoglobulinas A (IgA)	2 val.	Serumas, 1 ml	8 mėn. +15 - (+25) °C 8 mėn. +2 - (+8) °C 8 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Imunoturbidimetris	Kaip ir kitų turbidimetrinių ar nefelometrinių procedūrų metu, šis tyrimas gali nepateikti tikslių pacientų, sergančių monokloninėmis gamapatijomis, rezultatų, dėl individualių mėginio ypatybių, kurios gali būti nustatytos atliekant elektroforezę
LB33	Imunoglobulinas G (IgG)	2 val.	Serumas, 1 ml	4 mėn. +15 - (+25) °C 8 mėn. +2 - (+8) °C 8 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Imunoturbidimetris	Kaip ir kitų turbidimetrinių ar nefelometrinių procedūrų metu, šis tyrimas gali nepateikti tikslių pacientų, sergančių monokloninėmis gamapatijomis, rezultatų, dėl individualių mėginio ypatybių, kurios gali būti nustatytos atliekant elektroforezę

LB34	Imunoglobulinas M (IgM)	2 val.	Serumas, 1 ml	2 mėn. +15 - (+25) °C 4 mėn. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Imunoturbidimetris	Kaip ir kitų turbidimetrijų ar nefelometrijų procedūrų metu, šis tyrimas gali nepateikti tikslių pacientų, sergančių monokloninėmis gamapatijomis, rezultatų, dėl individualių mėginio ypatybių, kurios gali būti nustatytos atliekant elektroforezę
VT49	Imunoglobulinas D (IgD)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	48 val. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Radio imunodifuzinis	
VT491	G1 subklasė IgG**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	48 val. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Nefelometris	
VT492	G2 subklasė IgG**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	48 val. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Nefelometris	
VT493	G3 subklasė IgG**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	48 val. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Nefelometris	
VT494	G4 subklasė IgG**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	48 val. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Nefelometris	
TT50	Imunoglobulinų laisvos lengvosios kappa grandinės*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	7 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Nefelometris	
TT51	Imunoglobulinų laisvos lengvosios lambda grandinės*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	7 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Nefelometris	
VT70	Kalprotektinas	3 d.d.	Išmatos, nedidelis kiekis	4 d. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		CLIA	TYRIMAS ATLIEKAMAS PIRMADIENĮ, TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ Surenkant išmatų mėginį, vengti sąlyčio su vandeniu klozete.
LB76	Krioglobulinai*	15 d.d.	Serumas, 1 ml. Įmamas į šaltą mėgintuvėlį, pristačius į laboratoriją iškart dedamas į termostatą (+37°C)	10 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C *Transportavimo sąlygos nurodytos po mėginio inkubavimo +37° C	Ne	VUL SK	Imunonefelometris	Paimtas kraujo mėginys turi pilnai sukrešėti +37°C temperatūroje. Sukrešėjęs mėginys centrifuguojamas šaltai 3000 aps./10 min. Atskiriamas serumas gali būti gabenamas +2 - (+8) °C
LF142	Lytinius hormonus sujungiantis globulinas (SHBG)	2 val.	Serumas, 1 ml	5 d. +20 - (+25) °C 7 d. +2 - (+8) °C 12 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
VT96	Mioglobinas**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	3 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Fotometris	
LB36	Transferinas (TRANS)	2 val.	Serumas, 1 ml	8 d. +15 - (+25) °C 8 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Imunoturbidimetris	Labai retais atvejais gamapatijos, ypač IgM tipo (Waldenström makroglobulinemija), gali sąlygoti nepatikimus rezultatus
LB362	Tirpūs transferino receptoriai (sTFR)*	6 d.d.	Serumas, 1 ml	7 d. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Imunoturbidimetris	Retais atvejais gamapatijos, ypač IgM (Waldenstromo makroglobulinemija) gali įtakoti rezultatus.
LB72	CDT (karbohidratdeficitinis transferinas)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	7 d. +2 - (+8) °C 3 mėn.-15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Nefelometris	
LK201	Mikroalbumino kiekio šlapime nustatymas*	2 d.d.	Šlapimas, 20 ml	24 val +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK		Gabenamas/pristatomas šaltai, 2-8 ° C temperatūroje: 1. vienkartinis šlapimas/vienkartinio šlapimo indas; 2. paros šlapimas atpiltas į vienkartinį užsukamą šlapimo indelį. Pastaba: šiuo atveju, prieš atpilant šlapimą, būtina sumaišyti visą indo turinį ir nurodyti paros diurezę.
Baltymų elektroforezės tyrimai									
LB41	Serumo baltymų frakcijos elektroforezės būdu*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	3 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Kapiliarinė elektroforezė	
LB42	Gamatijų identifikavimas serume imunofiksacijos būdu*	6 d.d.	Serumas, 1 ml	7 d. +2 - (+8) °C 1 mėn.-15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Elektroforezė	Po centrifugavimo atskirtas į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo vienkartinį mėgintuvėlį kraujo serumas gabenamas/pristatomas šaltai, 2-8 ° C temperatūroje.
LB45	Hemoglobino elektroforezė*	5 d.d.	EDTA kraujas, 1 ml. Necentrifuguoti	5 d.d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Elektroforezė	Visas kraujo ėminys/visas vakuuminis mėgintuvėlis gabenamas/pristatomas šaltai, 2-8 ° C temperatūroje.Šaltai, 2-8 ° C temperatūroje.
Endokrininiai tyrimai									

LF68	17-hidroksiprogesteronas*	14 d.d.	Serumas, 1 ml	7 d. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Radioimuninis	Po centrifugavimo atskirtas į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo vienkartinį mėgintuvėlį kraujo serumas gabenamas/pristatomas šalta, 2-8 ° C temperatūroje. Pastaba: jei kraujo ėminys yra paimtas į vakuuminį mėgintuvėlį su gelio barjeru gali būti pristatytas visas nucentrifuguotas mėgintuvėlis.
LF38	Adrenokortikotropinis hormonas (ACTH, AKTH)	2 val.	EDTA plazma, 1 ml. Kraujas įimamas į atšaldytą mėgintuvėlį, kuris iškart po paėmimo dedamas ant ledo. <i>Plazmos atskyrimui naudokite atvėsintą centrifugą.</i>	2 val. +20 - (+25) °C 3 val. +2 - (+8) °C 10 sav. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	Jei tyrimo neagalima atlikti nedelsiant, mėginys turi būti užšaldytas ir gabenamas -20 °C	Taip		ECLIA	Naudoti stiklinius silikonu dengtus mėgintuvėlius arba plastikinius mėgintuvėlius, nes AKTH adsorbojamas antsilikonu nepadengtų stiklinių mėgintuvėlių, todėl sumažėja mėginio AKTH reikšmės. Naudojant AKTH 1-24 vaistus AKTH matavimų atlikti nerekomenduojame dėl neigiamos sąveikos su sluoksniinės struktūros tyrimu. Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
LB71	Aldosteronas*	2 d.d.	EDTA plazma, 1 ml	1 mėn. -15 - (-20) °C	−20±2 °C	Ne	VUL SK	CLIA	Po centrifugavimo atskirta į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo vienkartinį mėgintuvėlį kraujo plazma gabenama/pristatoma užšaldyta, −20±2 °C temperatūroje.
VT891	Dihidrostesteronas**	20 d.d.	Serumas, 2 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Skysčių chromatografija-masių spektrometrija (LCMS)	
VT53	Androstendionas**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
VT32	Antimulierinis hormonas (AMH)	2 val.	Serumas, 1 ml	3 d. +20 - (+25) °C 5 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	
LF151	Žmogaus chorioninis gonadotropinas (HCG) + beta HCG subvienetas	2 val.	Serumas, 1 ml	3 d.. +2 - (+8) °C 12 mėn. -15 - (-20) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
LF742	Laisvas beta žmogaus chorioninis gonadotropinas (L.beta HCG)	7 d.d.	Serumas, 1 ml	25 val. +15 - (+25) °C 8 d. +2 - (+8) °C 12 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Atliekamas TREČIADIENIAIS Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val. Mėginius galima užšaldyti 3 kartus.
LF37	Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-SO4)	2 val.	Serumas, 1 ml	5 d. +20 - (+25) °C 14 d. +2 - (+8) °C 12 mėn. 15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val. Mėginius galima užšaldyti 3 kartus.
VT541	Dehidroepiandrosteronas (DHEA)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	20 d. +2 - (+8) °C 28 d. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus		
VT703	Dopaminas**	20 d.d.	EDTA plazma (du violetiniai mėgintuvėliai), 2 ml.	1 mėn. -15- (-25) °C	-20 °C	Ne	Vokietija Cottbus	Didelio efektyvumo skysčių chromatografija	Prieš mėginio ėmimą vengti streso. 1 savaitę prieš, jei galima nenaudoti jokių vaistų. 3 dienas prieš nebevartoti kavos, arbatos, nikotino, bananų, riešutų, sūrio, šokolado ir kiaušinių. Kraują imti gulint po 30 minučių poilsio. <u>Plazmą iš kart nucentrifuguoti, atskirti ir užšaldyti.</u>
LB342	Eritropoetinas*	2 d.d.	Serumas, 1 ml	7 d. +2 - (+8) °C 2 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK		Po centrifugavimo atskirtas į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo vienkartinį mėgintuvėlį kraujo serumas gabenamas/pristatomas šalta, 2-8 ° C temperatūroje.
LF13	Estradiolis (E2)	2 val.	Serumas, 1 ml	24 val. +20 - (+25) °C 48 val. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Fulvestrantas (Faslodex, AstraZeneca, esrtrogenų antagonistas) didina estradiolio tyrimo rezultatą moterims, gydomoms šiuo vaistu. Jei gydymą fulvestrantu reikėtų keisti ar nutraukti dėl klaidingai padidintos estradiolio koncentracijos, moterų po menopauzės hormoninio fono ištyrimui rekomenduojama naudoti chromatografinį ar spektrometrinį estradiolio koncentracijos nustatymo metodus, kurie neturėtų būti veikiami fulvestranto. Klaidingi rezultatai gali būti aptinkami serume pacientų, kurie turėjo kontaktą su vakcina, turinčią trušio serumo, ar jei laiko trušį, kaip naminių augintinių. Steroidiniai vaistai gali daryti poveikį šiam tyrimui. Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
VT351	Estronas E1**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	

LF10	Folikulų stimuliuojantis hormonas (FSH)	2 val.	Serumas, 1 ml	5 d. +20 - (+25) °C 14 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti tik kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
VT91	Gastrinas**	20 d.d.	Serumas, 4 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	CLIA	Imamas rytinis mėginy. 12 valandų nevalgius ir nevartojus alkoholio. 24 val. prieš tyrimą nevartoti antacidinių, anticholinerginių vaistų, H2 blokerių, kofeino turinčių produktų. 5-7 dienas prieš tyrimą nutraukti vaistų, kurie slopina protonų siurblio darbą. Šie preparatai sukelia gastrino koncentracijos padidėjimą. Vyresnio amžiaus pacientams gali būti nustatoma padidėjusi gastrino koncentracija, kuri neturi klinikinės reikšmės.
TT13	Augimo faktorius IGF-1 (Somatomedinas C)*	2 d.d.	Serumas, 1 ml	1d. +2 - (+8) °C 12 mėn. -15 - (-20) °C	-20 °C	Ne	VUL SK	Konkurentinė RIA	Po centrifugavimo atskirtas į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo vienkartinį mėgintuvėlį kraujo serumas gabenamas/pristatomas užšaldytas. Pastaba: tais atvejais, kai ėminys pristatomas ne vėliau nei per 1 d. nuo paėmimo, kraujo serumas gali būti gabenamas/pristatomas šaltai, 2-8 ° C temperatūroje.
VT26	Inhibinas B**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	48 val. +2 - (+8) °C 3 mėn. -20 °C	-20 °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofermentinis	Kraujas imamas 3 - 5 menstruacinio ciklo dieną.
VT261	Inhibinas A**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	-20 °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofermentinis	
LB77	Kalcitoninas*	2 d.d.	Serumas, 1 ml	2 d. +15 - (+25) °C 4 d. +2 - (+8) °C 3 sav. -15 - (-20) °C	-20 °C	Ne	VUL SK	Chemoluminescentinis	Po centrifugavimo atskirtas į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo vienkartinį mėgintuvėlį kraujo serumas gabenamas/pristatomas užšaldytas.
LF681	17-hidroksipregnenolono koncentracijos nustatymas**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Skysčių chromatografija kartu su masės spektrografija	
LF332	Kortizolis ryte	2 val.	Serumas, 1 ml	24 val. +20 - (+25) °C 4 d. +2 - (+8) °C 12 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Nėštumas, kontraceptinės tabletės bei estrogenų terapija didina kortizolio kiekį serume. Ligoniams vartojantiems prednizoloną, metilprednizoloną ar prednizoną didėja kortizolio koncentracija. Taip pat ligoniams, turintiems 21- hidroksilazės trūkumą. Tiriant kortizolį, reikia atsižvelgti į cirkadinį ritmą. Stresinės būklės didina kortizolio kiekį. Rytinis valandos nuo 6 iki 10 val. Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
LF333	Kortizolis vakare	2 val.	Serumas, 1 ml	24 val. +20 - (+25) °C 4 d. +2 - (+8) °C 12 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
LF03	Laisvas tiroksinas (LT4)	2 val.	Serumas, 1 ml	5 d. +20 - (+25) °C 7 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Bet koks poveikis, galintis paveikti sujungiančiųjų baltymų jungiančiasias savybes, gali daryti įtaką FT4 tyrimų rezultatams (pvz., vaistai, ne skydliaukės ligos (angl. Non-Thyroid-Illness, NTIs)) ar pacientai, sergantys šeimine disalbuminemine hipertiroidinezija (angl. Familial Dysalbuminemic Hyperthyroxinemia - FDH). Tyrimas negali būti taikomas pacientams, gydomiems lipidus mažinančiais vaistais, į kurių sudėtį įeina D-T4. Jei tokiems pacientams reikia patikrinti skydliaukės funkciją, gydymas turėtų būti nutrauktas 4-6 savaitėms, kad vėl atsistatytų fiziologinė būseną.
LF042	Laisvas trijodtironinas (LT3)	2 val.	Serumas, 1 ml	5 d. +20 - (+25) °C 7 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Autoantikūnai prieš skydliaukės hormonus gali paveikti vertinimą. Surišimo baltymų anomalijos (pvz.: FDH - šeimynė disalbumininė hiperproteinemija) gali išaukti reikšmės, kurios būdingos tokiom būklei, nukrypstančias nuo tikėtinų rezultatų. Autoantikūnai prieš skydliaukės hormonus gali turėti įtakos tyrimui. Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
LF141	Laisvas androgenų indeksas (LAI)	2 val.	Serumas, 1 ml	5 d. +20 - (+25) °C 14 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Apskaičiuojamas	Norint apskaičiuoti LAI reikia užsakyti šiuos tyrmus: 1. Testosteronas; 2. SHBG.
VT104	Leptinas*	1 mėn.	Serumas, 2 ml	2 mėn. +2 - (+8) °C 2 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Radioimuninis	Po centrifugavimo atskirtas į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo vienkartinį mėgintuvėlį kraujo serumas gabenamas/pristatomas šaltai, 2-8 ° C temperatūroje.

LF09	Luteinizuojantis hormonas (LH)	2 val.	Serumas, 1 ml	5 d. +20 - (+25) °C 14 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	
LF111	Makroprolaktinas*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	7 d. +2 - (+8) °C 12 mėn.-15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	CLIA	Po centrifugavimo atskirtas į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo vienkartinį mėgintuvėlį kraujo serumas gabenamas/pristatomas šaltai, 2-8 ° C temperatūroje.
VT65	Nefrinai** (Laisvas metanefrinas, laisvas normometanefrinas)	20 d.d.	EDTA plazma (2-3 violetiniai mėgintuvėliai), 3 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	-20 °C	Ne	Vokietija Cottbus	LCMS	Prieš mėginio ėmimą vengti streso. 1 sav. jei galima neneudoti jokių vaistų. 3 d. prieš nebenaudoti kavos, arbatos, nikotino, bananų, riešutų, sūrio, šokolado ir kiaušinių. Kraują imti gulint po 30 min poilsio. Plazmą iš kart nucentrifuguoti, atskirti ir užšaldyti.
LF62	Parathormonas (PTH)	2 val.	Serumas arba EDTA plazma, 1 ml	Serumas: 8 val. +15 - (+25) °C 48 val. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-25) °C Plazma: 48 val. +15 - (+25) °C 3 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Dėl PTH nestabilumo neatskirtame serume, serumo mėgintuvėliai turėtų būti nedelsiant centrifuguojami. Tačiau nustatyta, kad PTH yra stabilus > 24 valandas kambario temperatūroje visame kraujyje, antikoaguliuotame su EDTA. Todėl pirmenybė turėtų būti teikiama EDTA plazmai. Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
LF12	Progesteronas	2 val.	Serumas, 1 ml	24 val. +20 - (+25) °C 5 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Fenilbutazonas slopina progesterono reikšmes. Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
LF79	Prokalcitoninas (PCT)	2 val.	Serumas, 1 ml	24 val. +20 - (+25) °C 48 val. +2 - (+8) °C 13 mėn. -15 - (-20) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	PCT koncentracija gali padidėti tam tikromis ne infekcinės kilmės situacijomis. Tai apima šias ir kitas būkles: • prolanguotas ar sunkus kardiogeninis šokas • prolanguotos sunkios organų perfuzijos anomalijos • smulkialąstelinis plaučių vėžys ar medulinė skydliaukės C-ląstelių karcinoma • anksstyvas laikotarpis po didelių traumų, didelių chirurginių intervencijų, sunkių nudegimų • gydymas, kuris stimuliuoja prouždegiminių citokinų išsiskyrimą • naujagimiai (< 48 h po gimimo) Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
LF11	Prolaktinas (Prol)	2 val.	Serumas, 1 ml	5 d. +20 - (+25) °C 14 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Retais atvejais aukšti AK titrai prieš ruteniumą gali pakelti Prol koncentraciją. Prol koncentracijai serume įtakos turi, kada imamas kraujo ėminys, nes Prol sekrecija yra epizodinė ir priklauso nuo asmens 24 val. ciklo. Prol koncentracija fiziologiškai didėja žindymo ir streso metu, be to didina vaistai - dibenzodiazepinai, fenotiazinas, TRH ir estrogenas. Prol sekreciją slopina dopaminas, L-dopa ir ergotamino dariniai. Moterys su endokrininėmis ligomis ir nėščios turi makroprolaktiną serume. Elecsys Prol tyrimas apima ir makroprolaktiną. Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
VT25	Reninas*	7 d.d.	EDTA plazma, 2 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	-20±2 °C	Ne	VUL SK	CLIA	Atskirt nuo kraujo ląstelių plazma nedelsiant užšaldoma -20 ±2 °C temperatūroje ir pristatoma užšaldyta.
VT89	Serotoninas**	20 d.d.	Serumas arba EDTA plazma, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Didelio efektyvumo skysta chromatografija	Tiriant Serotoniną, 3 dienas iki mėginio paėmimo rekomenduojama nevaruoti šių produktų: ananasų, baklažanų, avokadų, bananų, serbentų, pomidorų, melionų, vyšnių, slyvų, agrastų, graikiškų riešutų, chlorpromazino, mefenzinkarbamato, metokarbamolio. 2 d. prieš tyrimą nevaruoti Paracetamolio ir Aspirino.

LF39	Somatotropinis (augimo) hormonas (STH)*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	8 val. +2 - (+8) °C 2 mėn. -20 °C	-20 °C	Ne	VUL SK		Po centrifugavimo atskirtas į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo vienkartinį mėgintuvėlį kraujo serumas gabenamas/pristatomas užšaldytas. Pastaba: tais atvejais, kai ėminys pristatomas ne vėliau nei per 2 val. nuo paėmimo, kraujo serumas gali būti gabenamas/pristatomas šaltai, 2-8 ° C temperatūroje.
LF1411	Laisvas testosteronas	2 val.	Serumas, 1 ml	5 d. +20 - (+25) °C 7 d. +2 - (+8) °C 12 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		Apskaičiuojamas pagal formulę	Būtina papildomai užsakyti LB02, LF14 ir LF142
LF14	Testosteronas	2 val.	Serumas, 1 ml	5 d. +20 - (+25) °C 14 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Jei pacientas vartoja Nondraloną, netirti testosterono. Atskirais atvejais padidinti testosterono kiekiai pas moteris, kurios serga paskutine inkstų ligos stadija. Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
LF082	Tiroglobulinas (Tg)	2 val.	Serumas, 1 ml	14 d. +15 - (+25) °C 14 d. +2 - (+8) °C 24 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Tiroglobulino (Tg) koncentracijos nustatymui poveikį gali daryti anti-tiroglobulino antikūnai (anti-Tg) arba nespecifiniai paciento serumo veiksniai. Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
LF02	Tiroksinas (T4)*	3 d.d.	Serumas, 1 ml	6 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C		VUL SK	Imunologinis	
LF01	Skydliaukę stimuliuojantis hormonas (TSH, TTH) (Tirotropinas)	2 val.	Serumas, 1 ml	8 d. +20 - (+25) °C 14 d. +2 - (+8) °C 24 mėn. -15 - (-25) °C (galima šaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Autoantikūnų buvimas gali indukuoti didelės molekulinės masės kompleksus (makro-TSH), dėl kurių gali susidaryti neįprastai didelės TSH koncentracijos.
LF04	Trijodtironinas (T3)*	2 d.d.	Serumas, 1 ml	6 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	ECLIA	Kai gydymui skiriamas amiodaronas, T3 rodikliai gal sumažėti. Dėl fenitoino, fenilbutazono ir salicilatų vartojimo T3 atsipalaiduoja nuo rišančiųjų baltymų, tokiu būdu bendra T3 hormono koncentracija sumažėja, kai fT3 koncentracija yra normali. Patologinės sujungiančiųjų baltymų koncentracijos (TBG, albumino), gali lemti bendrųjų T3 koncentracijų nuokrypį nuo rekomenduojamų reikšmių, nustatomos koncentracijos būdingos eutiroidinės apykaitos būklems (pvz., NSL atvejų)pacientams, nėštumo metu, vartojant geriamuosius kontraceptikus). Tokiais atvejais reikalingas fT3 arba fT4 nustatymas.
Vėžio žymenys									
LF16	Alfa fetoproteinas (AFP)	2 val.	Serumas, 1 ml	5 d. +20 - (+25) °C 14 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti 3 kartus)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Jei tyrimas atliekamas nėščiosioms - nurodyti nėštumo savaitę. Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val. (kepenų pirminis vėžys, kepenų, kiaušidės germinaliųjų ląstelių, sėklidės germinaliųjų ląstelių CA).
VT30	TPA audinių polipeptidinis Ag**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	24 val. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Chemoluminescentinis	
VT04	Chromograninas A (CgA)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	7 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunoluminometrinis	
VT54	CYFRA 21-1	7 d.d.	Serumas, 1 ml	7 d. +20 - (+25) °C 30 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Atliekamas TREČIADIENIAIS
VT69	FGF-23 Fibroblastų augimo faktorius**	20 d.d.	EDTA plazma, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	-20 °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	Mėginį iš kart po paėmimo nucentrifuguoti, plazmą atskirti į tuščią mėgintuvėlį ir užšaldyti -20 °C.
LF18	Karcinoembrioninis antigenas (CEA), (st.žarnos,pl.žarnos, kolorektalinis, kepenų, krūties CA)	2 val.	Serumas, 1 ml	7 d. +20 - (+25) °C 14 d. +2 - (+8) °C 6 mėn.-15 - (-25) °C (galima užšaldyti 3 kartus)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
VT29	TNF alfa (Navikų nekrozės faktorius)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Chemoluminescentinis	
VT35	NSE Neurospecifinė enolazė**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Chemoluminescentinis	

VT36	SCC Plokščialąstelinės karcinomos antigenas**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Chemoluminescentinis	
LF22	Prostatos specifinis antigenas (PSA)	2 val.	Serumas, 1 ml	24 val. +20 - (+25) °C 5 d. +2 - (+8) °C 21 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Žinoma, kad retais atvejais egzistuoja PSA izoformos, kurios, skirtingais PSA tyrimais, gali būti skirtingai išmatuojamos. Buvo gauta atsitiktinių pranešimų apie tokio pobūdžio atvejus, naudojant skirtingų gamintojų PSA tyrimus. Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
LF222	Laisvas prostatos specifinis antigenas (LPSA)	7 d.d.	Serumas, 1 ml	8 val. +20 - (+25) °C 5 d. +2 - (+8) °C 3 mėn.-15 - (-20) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Atliekamas TREČIADIENIAIS Vartojant Flutamidą, LPSA reikšmės sumažėja. Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
LF224	Santykis LPSA su bendru PSA	7 d.d.	Serumas, 1 ml	8 val. +20 - (+25) °C 5 d. +2 - (+8) °C 3 mėn.-15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Apskaičiuojamas	Atliekamas TREČIADIENIAIS Norint apskaičiuoti santykį reikia užsakyti šiuos tyrmus: 1. PSA: 2. LPSA
LF70	Baltymas S100 (melanomos metastazių žymuo)	7 d.d.	Serumas, 1 ml	8 val. +15 - (+25) °C 48 val. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti 5 kartus)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Atliekamas TREČIADIENIAIS Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
LF19	Vėžio žymuo (CA 15-3), (krūties CA)	2 val.	Serumas, 1 ml	48 val. +20 - (+25) °C 5 d. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
LF192	ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) algoritmas	2 val.	Serumas, 1 ml	5 val. +20 - (+25) °C 48 val. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Apskaičiuojamas pagal formulę	
LF20	Vėžio žymuo (CA 19-9)	2 val.	Serumas, 1 ml	5 d. +20 - (+25) °C 14 d. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
LF21	Vėžio žymuo (CA 125), (kiaušidės epitelinų ląstelių CA)	2 val.	Serumas, 1 ml	8 val. +20 - (+25) °C 5 d. +2 - (+8) °C 21 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
LF82	Vėžio žymuo (CA 72-4)	2 val.	Serumas, 1 ml	24 val. +20 - (+25) °C 30 d. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
VT61	HE4 žmogaus skėlidės priedelio sekretuojamas baltymas (kiaušidžių vėžio žymuo)	2 val.	Serumas, 1 ml	5 val. +20 - (+25) °C 48 val. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15- (-25) °C (galima užšaldyti du kartus)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	
LF56	Kaulų rezorbcijos žymuo (beta-Cross Laps)**	20 d.d	Serumas arba EDTA plazma, 1 ml	24 val. +15 - (+25) °C 8 d. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ECLIA	Kraujas turi būti imamas ryte (7:30 -8:30 val.), nevalgius 12 va. Plazmos mėginiai yra stabilesni.
VT704	Zonulino nustatymas išmatose**	20 d.d	Išmatos, 5 mg	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofermentinis (ELISA)	Rekomenduojama tirti tik suformuotas išmatas.Skystose išmatose rezultatas yra žemesnis.
LF275	Vėžio žymuo CA 50**	20 d.d	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	IRMA - imunoradiometrinė analizė	
LF602	Vėžio žymuo Tumor M2-PK išmatose (dėl storosios žarnos vėžio)**	30 d.d.	Išmatos, 5 mg	24 val. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofermentinis (ELISA)	Rekomenduojama tirti tik suformuotas išmatas.Skystose išmatose rezultatas yra žemesnis.
LB432	Bens-Džonso baltymo identifikavimas šlapime*	6 d.d.	Šlapimas, 1 ml	7 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-20) °C	+15 - (+25) °C	Ne	VUL SK	Elektroforezės	Gabenamas/pristatomas šaltai, 2-8 °C temperatūroje: 1.vienkartinis šlapimas/vienkartinio šlapimo indas; 2.paros šlapimas, atpiltas į vienkartinį užsukamą šlapimo indelį.
VT31	Audinių specifinis polipeptidinis Ag**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Chemoluminescentinis	
VT62	TRAP tatarat rezistentiška rūgšti fosfatazė** (kaulų vėžys)	20 d.d.	Serumas, 1ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Fotometrinis	

VT66	ProGRP** Pro gastrino relizinis propeptidas (Plaučių vėžio žymuo)	20 d.d.	EDTA plazma, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ECLIA	
VT68	Her-2/neu Žmogaus epidermio augimo faktoriaus receptorių/neuroblastoma (Krūties vėžio žymuo)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ECLIA	
Fermentai									
LB18	Aspartatminotransferazė (AST)	2 val.	Serumas, 1 ml	4 d. +20 - (+25) °C 7 d. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-25) °C (galima šaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		Fotometrinis, IFCC	
LB221	Alfa-amilazė (AMYL) serume	2 val.	Serumas, 1 ml	7 d. +15 - (+25) °C 1 mėn. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fermentinis fotometrinis IFCC	Vengti hemolizės. Icodextrin pagrindo vaistai gali sumažinti amyl kiekį. Retais atvejais gamapatijos, ypač IgM (Waldenstromo makroglobulinemija) gali įtakoti rezultatus. Padidintas P-Amyl aktyvumas serume nėra diagnostinis pankreatito žymuo.
LB19	Alanininė transaminazė (ALT)	2 val.	Serumas, 1 ml	4 d. +15 - (+25) °C 7 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fotometrinis, IFCC	Vengti hemolizės.
LB20	Gama-gliutamiltanspeptidazė (GGT)	2 val.	Serumas, 1 ml	7 d. +15 - (+25) °C 7 d. +2 - (+8) °C 1 metai -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fermentinis kolorimetris IFCC/Szasz	
LB251	Pankreatinė alfa-amilazė (P-AMYL) serume	2 val.	Serumas, 1 ml	7 d. +15 - (+25) °C 1 mėn. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fotometrinis, IFCC	Vengti hemolizės. Icodextrin pagrindo vaistai gali sumažinti amyl kiekį. Retais atvejais gamapatijos, ypač IgM (Waldenstromo makroglobulinemija) gali įtakoti rezultatus. Padidintas P-Amyl aktyvumas serume nėra diagnostinis pankreatito žymuo.
LF611	Kasos elastazės 1 kiekybinis nustatymas išmatose ELISA metodu**	30 d.d.	Išmatos, 5 mg	3 d. +2 - (+8) °C 1 metai -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofermentinis (ELISA)	Rekomenduojama tirti tik suformuotas išmatas.Skystose išmatose rezultatas yra žemesnis.
LB23	Kreatinkinazė (CK-NAC)	2 val.	Serumas, 1 ml	48 val. +20 - (+25) °C 7 d. +4 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fotometrinis, 6GPDH	Vengti hemolizės. Retais atvejais gamapatijos, ypač IgM (Waldenstromo makroglobulinemija) gali įtakoti rezultatus. Hidroksikobalaminas gali pakeisti tyrimo rezultatus
LB231	Kreatinkinazės širdies izofermentas (CK-MB)*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	8 val. +15 - (+25) °C 3 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK		Vengti hemolizės.
LB232	Kreatinkinazės izofermentų elektroforezė*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	7 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK		
LB80	Laktatdehidrogenazės (LDH) izofermentų elektroforezė**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	+2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Elektroforezė	Nešaldyti +2 - (+8) °C
LB27	Laktatdehidrogenazė (LDH)	2 val.	Serumas, 1 ml	7 d. +15 - (+25) °C 4 d. +2 - (+8) °C 6 sav. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fotometrinis, IFCC	Retais atvejais gamapatijos, ypač IgM (Waldenstromo makroglobulinemija) gali įtakoti rezultatus. Esant tam tikroms ligoms (pvz.:hepatopatijai, skeleto raumenų ligoms, piktybiniais augliams), LDH-4 ir LDH-5izofermentų frakcijos yra padidėjusios ir nestabilios atvėsintuose ir šaldytuose mėginiuose; tai gali sąlygoti neteisingas mėginių, paimtų iš pacientų sergančių šiomis ligomis, LDH reikšmes.
LB28	Lipazė (LIP)	2 val.	Serumas, 1 ml	Serume: 7 d. +20 - (+25) °C 7 d. +4 - (+8) °C 1 metai -15 - (-20) °C Plazmoje: 7 d. +20 - (+25) °C 7 d. +4 - (+8) °C 2 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fermentinis kolorimetris	Kalcio dobesilatas lemia dirbtinai žemus lipazės rezultatus.. Retais atvejais gamapatijos, ypač IgM (Waldenstromo makroglobulinemija) gali įtakoti rezultatus.
LB21	Šarminė fosfatazė (ALP)	2 val.	Serumas, 1 ml	7 d. +20 - (+25) °C 7 d. +4 - (+8) °C 2 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Kolorimetris	Retais atvejais gamapatijos, ypač IgM (Waldenstromo makroglobulinemija) gali įtakoti rezultatus.
LB44	Serumo lipoproteinų frakcijos elektroforezės būdu*	6 d.d.	Serumas, 1 ml	7 d. +2 - (+8) °C 2 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Elektroforezės	Po centrifugavimo atskirtas į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo vienkartinį mėgintuvėlį kraujo serumas gabenamas/pristatomas šaltai, 2-8 ° C temperatūroje.

LB441	Šarminės fosfatazės izofermentų elektroforezė**	6 d.d.	Serumas, 1 ml	7 d. +2 - (+8) °C 2 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Elektroforezės	Po centrifugavimo atskirtas į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo vienkartinį mėgintuvėlį kraujo serumas gabenamas/pristatomas šaltai, 2-8 ° C temperatūroje.
LB211	Kaulų ŠF**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Elektroforezės	Nevalgyti prieš mėginio paėmimą 12 val.
LB26	Cholinesterazė (CHE)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	6 val. +15 - (+25) °C 7 d. +2 - (+8) °C 1 metai -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Kolorimetrisinis (S-butyrlthiocholino jodido)	Retais atvejais gamapatijos, ypač IgM (Waldenstromo makroglobulinemija) gali įtakoti rezultatus.
VT56	Triptazė**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Fluoro-fermentinis- imunologinis	Mėginys imamas ne anksčiau kaip po 15 min ir ne vėliau kaip po 3 val. nuo anafilaksinės reakcijos pradžios.
Geležies apykaitos tyrimai									
LB35	Feritinas (FERRI)	2 val.	Serumas, 1 ml	48 val. 20-25 °C, 7 dienas 2-8 °C , 12 mėn. -20 °C (± 5 °C). Mėginius galima užšaldyti du kartus.	+2 - (+8) °C	Taip		Dalelėmis sustiprintas imunoturbidimetris	Retais atvejais gamapatijos, ypač IgM (Waldenstromo makroglobulinemija) gali įtakoti rezultatus.
LB361	Transferino įsotinimas	2 val.	Serumas, 1 ml	10 d. +2 - (+8) °C 1 mėn.-15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Apskaičiuojamas	Norint apskaičiuoti įsotinimą reikia užsakyti šiuos tyrmus: 1. Geležis; 2. Transferinas.
LB671	TIIBC (bendra geležies sujungimo geba)*	2 d.d.	Serumas, 1 ml	3 sav. +2 - (+8) °C 12 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Apskaičiuojamas	Po centrifugavimo atskirtas į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo vienkartinį mėgintuvėlį kraujo serumas gabenamas/pristatomas standartinėmis sąlygomis, 20 ± 5° C temperatūroje.
LB05	Geležis (Fe)	2 val.	Serumas, 1 ml	7 d. +15 - (+25) °C 3 sav. +2 - (+8) °C porą metų -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fotometrisinis, FerroZino	Vengti hemolizės. Ligoniams, gydomiems su metalus surišančiais vaistais, Fe koncentracija gali būti sumažėjusi. Retais atvejais gamapatijos, ypač IgM (Waldenstromo makroglobulinemija) gali įtakoti rezultatus.
Inkstų funkcijos tyrimai									
LB12	Kreatininas (CREA)	2 val.	Serumas, 1 ml	Serume/plazmoje: 7 d. +15 - (+25) °C 7 d. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fotometrisinis, Fermentinis	Labai retais atvejais gamapatijos, ypač IgM tipo (Waldenström makroglobulinemija), gali sąlygoti nepatikimus rezultatus. Reikšmės < 0.2 mg/dL (< 18 μmol/L) arba neigiami rezultatai retais atvejais gaunami < 3 metų vaikams ir vyresniems pacientams. Levodopa ir kalcio dobesilas nulemia dirbtinai žemą kreatinino koncentraciją tirtomis vaistų koncentracijomis, o DL-prolinas > 1 mmol/L koncentracija nulemia klaidingai aukštus rezultatus. 2-fenil-1,3-indandionas (Fenindionas) terapinėmis koncentracijomis daro poveikį tyrimui. Dicinonas (Etamzilas) terapinėmis koncentracijomis gali nulemti klaidingai žemus rezultatus. N-Acetilcisteinas didesnei nei 333 mg/L koncentracija plazmoje ir acetaminofeno metabolitas Nacetilp-benzochinono iminas (NAPQI) gali nepriklausomai nulemti klaidingus žemus rezultatus
LB0561	Kreatininas (CREA) su glomerulų filtracijos greičiu (GFG)	2 val.	Serumas, 1 ml	Serume/plazmoje: 7 d. +15 - (+25) °C 7 d. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fotometrisinis, Fermentinis	Labai retais atvejais gamapatijos, ypač IgM tipo (Waldenström makroglobulinemija), gali sąlygoti nepatikimus rezultatus. Reikšmės < 0.2 mg/dL (< 18 μmol/L) arba neigiami rezultatai retais atvejais gaunami < 3 metų vaikams ir vyresniems pacientams. Levodopa ir kalcio dobesilas nulemia dirbtinai žemą kreatinino koncentraciją tirtomis vaistų koncentracijomis, o DL-prolinas > 1 mmol/L koncentracija nulemia klaidingai aukštus rezultatus. 2-fenil-1,3-indandionas (Fenindionas) terapinėmis koncentracijomis daro poveikį tyrimui. Dicinonas (Etamzilas) terapinėmis koncentracijomis gali nulemti klaidingai žemus rezultatus. N-Acetilcisteinas didesnei nei 333 mg/L koncentracija plazmoje ir acetaminofeno metabolitas Nacetilp-benzochinono iminas (NAPQI) gali nepriklausomai nulemti klaidingus žemus rezultatus
LB123	Kreatininas (CREA) šlapime*	1 d.d.	Šlapimas, 20 ml	Šlapime (be konservanto): 48 val. +15 - (+25) °C 6 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK		
LB124	Albumino/kreatinino santykis šlapime*	1 d.d.	Šlapimas, 20 ml		+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Apskaičiuojamas	Norint apskaičiuoti santykį reikia užsakyti šiuos tyrmus: 1. Albuminas šlapime; 2. Kreatininas šlapime.

LB11	Šlapalas (UREA)	2 val.	Serumas, 1 ml	Serume/plazmoje: 7 d. +15 - (+25) °C 7 d. +2 - (+8) °C 1 metai -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fermentinis kinetinis	Bakterinis augimas ėminiuose ir aukštos oro amonio koncentracijos, taip pat kaip ir užteršimas amonio jonais, gali sukelti klaidingai padidintus rezultatus. Retais atvejais gamapatijos, ypač IgM (Waldenstromo makroglobulinemija) gali įtakoti rezultatus.
LB13	Šlapimo rūgštis (UA)	2 val.	Serumas, 1 ml	3 d. +20 - (+25) °C 7 d. +4 - (+8) °C 6 mėn. -20 °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fermentinis kolorimetrinis	Kalcio dobesilas (pvz.: Dexium) daro poveikį terapinėms koncentracijomis (dirbtinai maža šlapimo rūgšties koncentracija). Dicinonas (Etamsilas) terapinėmis ncentracijomis gali lemti klaidingai žemus rezultatus. N-Acetilcisteinas, terapinėmis koncentracijomis naudojant kaip priešnuodį, bei acetaminofeno metabolitas Nacetilp-benzochinono iminas (NAPQI) gali nepriklausomai nulemti klaidingai žemus rezultatus. Labai retais atvejais gamapatijos, ypač IgM tipo (Waldenström makroglobulinemija), gali sąlygoti nepatikimus rezultatus.
VT8631	Šlapimo rūgštis šlapime*	2 d.d.	24 val. šlapimas, tyrimui atpilti 50 ml. Nurodyti paros šlapimo kiekį.	2 d. +20 - (+5) °C 2 d. +2 - (+8) °C	+20 - (+5) °C	Ne	VUL SK	Spektrofotometrinis	
Kepenų funkcijos tyrimai (išskyrus fermentus)									
LB82	Amoniaiko koncentracijos nustatymas*	2 d.d.	Ličio heparino plazma (žalias mėgintuvėlis), 1 ml	2 val. +2 - (+8) °C 3 sav. -15 - (-20) °C	-20 °C	Ne	VUL SK		Po centrifugavimo atskirta į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo vienkartinį mėgintuvėlį kraujo plazma gabenama/pristatoma užšaldyta
LB14	Bendras bilirubinas (BIL-T)	2 val.	Serumas, 1 ml Saugoti nuo šviesos.	1 diena +15 - (+25) °C 7 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C			Fotometrinis, diazo	Cyanokit (Hidroksokobalaminas) gali lemti klaidingai žemus rezultatus. Kai kurių dauginės mielomos pacientų rezultatai gali turėti teigiamą nuokrypį. Ne visiems dauginės mielomos pacientams būdingas šis nuokrypis ir jo dydis skiriasi priklausomai nuo paciento. Retais atvejais gamapatijos, ypač IgM (Waldenstromo makroglobulinemija) gali takoti rezultatus. Hidroksikobalaminas gali pakeisti tyrimo rezultatus. Pacientams, kuriems dėl kitų procedūrų buvo taikoma kontrastinė medžiaga indocianinas žaliasis (ICG), bilirubino kiekis neturi būti tiriamas.
LB15	Tiesioginis bilirubinas (BIL-D)	2 val.	Serumas, 1 ml Saugoti nuo šviesos.	48 val. +15 - (+25) °C 7 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fotometrinis, diazo	Fenilbutazonas sąlygoja dirbtinai žemus bilirubino koncentracijos rezultatus. Labai retais atvejais gamapatijos, ypač IgM tipo (Waldenström makroglobulinemija), gali sąlygoti nepatikimus rezultatus. Pacientams, kuriems dėl kitų procedūrų buvo taikoma kontrastinė medžiaga indocianinas žaliasis (ICG), bilirubino kiekis neturi būti tiriamas.
LB151	Netiesioginis bilirubinas	2 val.	Serumas, 1 ml			Taip		Apskaičiuojamas	Apskaičiuojamas iš BIL-T ir BIL-D
VT81	Tulžies rūgštys serume*	1 d.d.	Serumas, 2 ml	7 d. +2 - (+8) °C 12 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Fotometrinis	Nevalgyti 12 val. prieš tyrimą
Lipidų apykaitos žymenys									
LB37	Apolipoproteinas A1 (APOA1)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	24 val. +15 - (+25) °C 8 d. +2 - (+8) °C 2 mėn. -15 - (-20) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunoturbidimetris	Labai retais atvejais gamapatijos, ypač IgM tipo (Waldenström makroglobulinemija), gali sąlygoti nepatikimus rezultatus
LB38	Apolipoproteinas B (APOB)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	24 val. +15 - (+25) °C 8 d. +2 - (+8) °C 2 mėn. -15 - (-20) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunoturbidimetris	Labai retais atvejais gamapatijos, ypač IgM tipo (Waldenström makroglobulinemija), gali sąlygoti nepatikimus rezultatus
LB381	Apolipoproteinų A1 ir B santykio nustatymas**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	24 val. +15 - (+25) °C 8 d. +2 - (+8) °C 2 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Apskaičiuojamas	Norint apskaičiuoti santykį reikia užsakyti šiuos tyrmus: 1. APOA1; 2. APOB
LB69	Lipoproteinas a [Lp(a)]	2 val.	Serumas, 1 ml	8 val. +15 - (+25) °C 48 val. +2 - (+8) °C 3 mėn. -70 °C	+2 - (+8) °C	Taip		Imunoturbidimetris	Labai retais atvejais gamapatijos, ypač IgM tipo (Waldenström makroglobulinemija), gali sąlygoti nepatikimus rezultatus.
LB17	Cholesterolis (CHOL)	2 val.	Serumas, 1 ml	7 d. +15 - (+25) °C 7 d. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fotometrinis, CHOD/POD	

LB39	Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis (DTL-choI)	2 val.	Serumas, 1 ml	Serume: 72 val. +15 - (+25) °C 7 d. +2 - (+8) °C 12 mėn. -15 - (-20) °C Plazmoje: 72 val. +15 - (+25) °C 7 d. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fotometrinis, homogeninis fermentinis	Padidinta koncentracija laisvų riebiųjų rūgščių ir denaturuotų baltymų gali klaidingai padidinti DTL-choI rezultatus. Retais atvejais, padidėjusi imunoglobulinų koncentracija gali sąlygoti dirbtinai padidėjusius DTL-cholesterolio rezultatus. Retais atvejais gamapatijos, ypač IgM (Waldenstromo makroglobulinemija) gali įtakoti rezultatus. Sutrikusi kepenų funkcija veikia lipidų metabolizmą; tuomet DTL ir MTL rezultatai yra ribotos diagnostinės vertės. Kai kurių pacientų su nenormalia kepenų funkcija, DTL-cholesterolio rezultatai gali reikšmingai skirtis nuo DCM (designated comparison method) rezultatų. N-Acetilcisteinas, terapinėmis koncentracijomis naudojant kaip priešnuodį, bei acetaminofeno metabolitas N-acetil-p-benzochinono iminas (NAPQI) gali nepriklausomai nulemti klaidingai žemus rezultatus.
LB40	Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis (MTL-choI)	2 val.	Serumas, 1 ml	7 d. +2 - (+8) °C 12 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fotometrinis, homogeninis fermentinis	N-Acetilcisteinas, terapinėmis koncentracijomis naudojant kaip priešnuodį, bei acetaminofeno metabolitas N-acetil-p-benzochinono iminas (NAPQI) gali nepriklausomai nulemti klaidingai žemus MTL-C rezultatus. Sutrikusi kepenų funkcija veikia lipidų metabolizmą; tuomet DTL ir MTL rezultatai yra ribotos diagnostinės vertės. Kai kurių pacientų su sutrikusia kepenų funkcija, MTL-C rezultatai yra reikšmingai mažesni palyginus su beta kiekypinio nustatymo rezultatais. EDTA plazmos reikšmės gali būti mažesnės už serumo. Labai retais atvejais gamapatijos, ypač IgM tipo (Waldenström makroglobulinemija), gali sąlygoti nepatikimus rezultatus
LB16	Trigliceridai (Trig)	2 val.	Serumas, 1 ml	Serume: 48 val. +20 - (+25) °C 10 d. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-20) °C Plazmoje: 48 val. +20 - (+25) °C 15 d. +2 - (+8) °C 3 mėn.-15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fotometrinis, GPO-PAP	
LB1717	Lipidograma	2 val.	Serumas, 1 ml	7 d. +15 - (+25) °C 7 d. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fermentinis kolorimetris	Tyrimą sudaro 5 analitės: Cholesterolis; DTL; MTL; Trigliceridai: NeDTL.
LB171	Cholesterolio aterogeniškumo koeficiento apskaičiavimas	2 val.	Serumas, 1 ml			Taip		Apskaičiuojamas	Norint apskaičiuoti koeficientą reikia užsakyti šiuos tyrmus: 1. Cholesterolis; 2. DTL.
LB83	Oksiduotas mažo tankio lipoproteinas (oxMTL)**	20 d.d.	Seumas, 2 ml	5 d. +2 - (+8) °C 13 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
Širdies žymenys (išskyrus fermentus)									
LF67	NT- proBNP (NT - pro smegenų natriuretinis peptidas)	2 val.	Serumas, 1 ml	3 d. +20 - (+25) °C 6 d. +2 - (+8) °C 24 mėn. -20 °C	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Vengti hemolizės
LF672	ST2	2 d.d.	Serumas arba EDTA plazma, 1 ml	48 val. +20 - (+25) °C 7 d. +2 - (+8) °C >18 mėn. -20 °C	+2 - (+8) °C	Ne	Rezus.lt	ELISA	
LF34	Didelio jautrumo Troponinas - T	1 val.	Serumas arba EDTA plazma, 1 ml	24 val. +2 - (+8) °C 12 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
Mineralų, kaulų, sąnarių ir jungiamojo audinio tyrimai									
LB07	Fosforas (PHOS)	2 val.	Serumas, 1 ml	24 val. +15 - (+25) °C 4 d. +2 - (+8) °C 1 metai -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		UV - absorbcija	Vengti hemolizės. Fosfolipidus turintys liposominės vaistų formos (pvz.: AmBisome) gali padidinti fosforo reikšmes. Retais atvejais gamapatijos, ypač IgM (Waldenstromo makroglobulinemija) gali įtakoti rezultatus.

LB071	Fosforas (PHOS) šlapime*	1 d.d.	Šlapimas, 20 ml	4d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK		Gabenamas/pristatomas šaltai, 2-8 ° C temperatūroje: 1.vienkartinis šlapimas/vienkartinio šlapimo indas; 2.paros šlapimas atpiltas į vienkartinį užsukamą šlapimo indelį. Pastaba: šiuo atveju, prieš atpilant šlapimą, būtina sumaišyti visą indo turinį ir nurodyti paros diurezę. 2.Pastaba: tais atvejais, kai ėminys pristatomas ne vėliau nei per 1 d. nuo paėmimo gali būti gabenamas/pristatomas standartinėmis sąlugomis, 20 ± 25 ° C temperatūroje.
LB041	Jonizuotas kalcis (Ca++)	2 val.	Serumas, 1 ml	7 d. +15 - (+25) °C 3 sav. +2 - (+8) °C 8 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Apskaičiuojamas	
LB04	Kalcis (Ca)	2 val.	Serumas, 1 ml	7 d. +15 - (+25) °C 3 sav. +2 - (+8) °C 8 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		Fotometrinis, NM-BAPTA	Rekomenduojama tirti 12 val. nevalgius Labai retais atvejais gamapatijos, ypač IgM tipo (Waldenström makroglobulinemija), gali sąlygoti nepatikimus rezultatus.
LB043	Kalcis (Ca) šlapime*	1 d.d.	Šlapimas, 20 ml	48 val. +15 - (+20) °C 4 d. +2 - (+8) °C 3 sav. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Kolorimetrinis	Gabenamas/pristatomas šaltai, 2-8 ° C temperatūroje: 1.vienkartinis šlapimas/vienkartinio šlapimo indas; 2.paros šlapimas atpiltas į vienkartinį užsukamą šlapimo indelį. Pastaba: šiuo atveju, prieš atpilant šlapimą, būtina sumaišyti visą indo turinį ir nurodyti paros diurezę.
LB042	Kalcis paros šlapime*	1 d.d.	24 val šlapimas, tyrimui atpilti 50 ml. Nurodyti paros šlapimo kiekį.	48 val. +15 - (+20) °C 4 d. +2 - (+8) °C 3 sav. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Kolorimetrinis	Gabenamas/pristatomas šaltai, 2-8 ° C temperatūroje: 1.vienkartinis šlapimas/vienkartinio šlapimo indas; 2.paros šlapimas atpiltas į vienkartinį užsukamą šlapimo indelį. Pastaba: šiuo atveju, prieš atpilant šlapimą, būtina sumaišyti visą indo turinį ir nurodyti paros diurezę.
LB06	Magnis (Mg)	2 val.	Serumas, 1 ml	7 d. +15 - (+25) °C 7 d. +2 - (+8) °C 1 metai -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fotometrinis, ksilidilo mėlio	Retais atvejais gamapatijos, ypač IgM (Waldenstromo makroglobulinemija) gali įtakoti rezultatus.
LB0601	Magnis šlapime*	1 d.d.	24 val šlapimas, tyrimui atpilti 50 ml. Nurodyti paros šlapimo kiekį.	2 d. +15 - (+25) °C 2 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Spektrofotometrinis	
LF51	Osteokalcinas N-Mid (kaulų apykaitos, formavimosi žymuo)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	8 val. +15 - (+25) °C 3 d. +2 - (+8) °C 3 mėn. -20°C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ECLIA	Venkite hemolizės. Eritrocitų sudėtyje yra proteazių, kurios skaido osteokalciną. Rekomenduojama, kad mėginys būtų nucentrifuguotas per 2 val. nuo kraujo paėmimo.
Vienvalenčiai elektrolitai									
LB03	Kalis (K), natris (Na), chloras (Cl)	2 val.	Serumas arba Ličio heparino plazma, 1 ml. Atskirti serumą nuo krešulio per 1 val., o plazmą nuo eritrocitų tuoj pat.	24 val. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Netiesioginė potenciometrija, ISE	Naudokite serumą be hemolizės ir ryškos lipemijos. Kalio koncentracija serume yra didesnė palyginus su plazma. Plazma yra pasirinktina vietoj serumo, kaip mėginio medžiaga, skirta kalio koncentracijos nustatymui. Serumo kalis atspalaiduoja krešėjimo metu iš trombocitų. Kuo didesnis trombocitų skaičius, tuo didesnė paklaida. Ca-dobesilate, phenylbutazone, acetylsalicylic acid ir ibuprofen gali dirbtinai sukelti Cl padidėjimą.
LB031	Kalis (K)	2 val.	Serumas arba Ličio heparino plazma, 1 ml. Atskirti serumą nuo krešulio per 1 val., o plazmą nuo eritrocitų tuoj pat.	24 val. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Netiesioginė potenciometrija, ISE	Naudokite serumą be hemolizės ir ryškos lipemijos. Kalio koncentracija serume yra didesnė palyginus su plazma. Plazma yra pasirinktina vietoj serumo, kaip mėginio medžiaga, skirta kalio koncentracijos nustatymui. Serumo kalis atspalaiduoja krešėjimo metu iš trombocitų. Kuo didesnis trombocitų skaičius, tuo didesnė paklaida.
LB032	Natris (Na)	2 val.	Serumas arba Ličio heparino plazma, 1 ml. Atskirti serumą nuo krešulio per 1 val., o plazmą nuo eritrocitų tuoj pat.	14 d. +15 - (+25) °C 14 d. +2 - (+8) °C porą metų -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Netiesioginė potenciometrija, ISE	Naudokite serumą be hemolizės ir ryškos lipemijos.
LB033	Chloras (Cl)	2 val.	Serumas arba Ličio heparino plazma, 1 ml. Atskirti serumą nuo krešulio per 1 val., o plazmą nuo eritrocitų tuoj pat.	7 d. +15 - (+25) °C 7 d. +2 - (+8) °C porą metų -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Netiesioginė potenciometrija, ISE	Naudokite serumą be hemolizės ir ryškos lipemijos. Ca-dobesilate, phenylbutazone, acetylsalicylic acid ir ibuprofen gali dirbtinai sukelti Cl padidėjimą.
LB034	Kalis (K), natris (Na), chloras (Cl) šlapime*	1 d.d.	24 val. šlapimas, tyrimui atpilti 50 ml. Nurodyti paros šlapimo kiekį.	48 val. +15 - (+20) °C 4 d. +2 - (+8) °C 3 sav. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Jonoselektyvinis (tiesioginis)	

VT85	Osmoliariškumas šlapime**	20 d.d.	Šlapimas, 5ml	+2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Užšalimo temperatūros matavimas specialme įrenginyje ir apskaičiavimas pagal kalibracijas	
VT851	Osmoliariškumas serume**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Užšalimo temperatūros matavimas specialme įrenginyje ir apskaičiavimas pagal kalibracijas	
Mikrolementai									
VT5962	Aluminis **	20 d.d.	Serumas, 2 ml - SPU	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	Atskiri pamatinių biologinių verčių intervalai asmenims iki 18 metų nėra pateikiami.
VT5983	Aluminio (Al) nustatymas šlapime**	20 d.d.	Šlapimas, 50 ml arba 24 val. šlapimas, tyrimui atpilti 50 ml. Nurodyti paros šlapimo kiekį.	7 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	Rekomenduojama 48 valandas prieš mėginio paėmimą nevartoti žuvies produktų. Atskiri pamatinių biologinių verčių intervalai asmenims iki 18 metų nėra pateikiami.
VT5963	Arsenas**	20 d.d.	Serumas, 2 ml - SPU	1 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	Rekomenduojama 48 valandas prieš mėginio paėmimą nevartoti žuvies produktų. Atskiri pamatinių biologinių verčių intervalai asmenims iki 18 metų nėra pateikiami.
VT941	Arsenas šlapime**	20 d.d.	Šlapimas, 50 ml	7 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	Rekomenduojama 48 valandas prieš mėginio paėmimą nevartoti žuvies produktų. Atskiri pamatinių biologinių verčių intervalai asmenims iki 18 metų nėra pateikiami.
VT5964	Berilis**	20 d.d.	Serumas, 1 ml - SPU	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	Atskiri pamatinių biologinių verčių intervalai asmenims iki 18 metų nėra pateikiami.
VT595	Švinas**	20 d.d.	EDTA arba Ličio heparino kraujas, 1 ml NECENTRIFUGUOTI	7 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	Atskiri pamatinių biologinių verčių intervalai asmenims iki 18 metų nėra pateikiami.
VT597	Chromas**	20 d.d.	Serumas, 1 ml - SPU	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	Atskiri pamatinių biologinių verčių intervalai asmenims iki 18 metų nėra pateikiami.
VT5965	Kobaltas**	20 d.d.	Serumas, 2 ml SPU	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	Atskiri pamatinių biologinių verčių intervalai asmenims iki 18 metų nėra pateikiami.
VT5966	Fluoridas**	20 d.d.	Serumas, 2 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Fotometrija	Atskiri pamatinių biologinių verčių intervalai asmenims iki 18 metų nėra pateikiami.
VT5967	Auksas**	20 d.d.	Serumas, 4 ml - SPU	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	Atskiri pamatinių biologinių verčių intervalai asmenims iki 18 metų nėra pateikiami.
VT5968	Manganas**	20 d.d.	Serumas, 2 ml - SPU	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	Atskiri pamatinių biologinių verčių intervalai asmenims iki 18 metų nėra pateikiami.
VT5969	Molibdenas**	20 d.d.	Serumas - SPU arba EDTA plazma, 2 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	Atskiri pamatinių biologinių verčių intervalai asmenims iki 18 metų nėra pateikiami.
VT5970	Nikelis**	20 d.d.	Serumas, 2 ml - SPU	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	Atskiri pamatinių biologinių verčių intervalai asmenims iki 18 metų nėra pateikiami.
VT5971	Paladis**	20 d.d.	Serumas - SPU arba Ličio heparino kraujas, 2 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	Atskiri pamatinių biologinių verčių intervalai asmenims iki 18 metų nėra pateikiami.
VT5972	Sidabras**	20 d.d.	Serumas, 2 ml - SPU	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	Atskiri pamatinių biologinių verčių intervalai asmenims iki 18 metų nėra pateikiami.
VT5980	Boras**	20 d.d.	Serumas, 2 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	Atskiri pamatinių biologinių verčių intervalai asmenims iki 18 metų nėra pateikiami.
VT5981	Stroncis**	20 d.d.	Serumas, 2 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	Atskiri pamatinių biologinių verčių intervalai asmenims iki 18 metų nėra pateikiami.
VT23	Selenas**	20 d.d.	Serumas, 2 ml - SPU	5 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Atominės absorbcijos spektroskopija	Bent 3 dienas prieš tyrimo atlikimą rekomenduojama nevartoti seleno papildų.

VT5973	Talis**	20 d.d.	EDTA kraujas, 2 ml	7 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	Atskiri pamatinių biologinių verčių intervalai asmenims iki 18 metų nėra pateikiami.
VT5974	Bismutas**	20 d.d.	Serumas, 2 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	Atskiri pamatinių biologinių verčių intervalai asmenims iki 18 metų nėra pateikiami.
VT598	Gyvsidabris**	20 d.d.	EDTA kraujas, 2 ml	+2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	2 savaites prieš tyrimą rekomenduojama nevalgyti žuvies ir jūros gėrybių. Atskiri pamatinių biologinių verčių intervalai asmenims iki 18 metų nėra pateikiami.
VT5977	Gyvsidabrio nustatymas šlapime **	20 d.d.	Šlapimas, 50 ml	+2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	Atskiri pamatinių biologinių verčių intervalai asmenims iki 18 metų nėra pateikiami.
VT5975	Alavas**	20 d.d.	Serumas, 2 ml - SPU	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	Atskiri pamatinių biologinių verčių intervalai asmenims iki 18 metų nėra pateikiami.
VT5976	Kadmis**	20 d.d.	EDTA kraujas 2 ml, šlapimas	+2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	Atskiri pamatinių biologinių verčių intervalai asmenims iki 18 metų nėra pateikiami.
VT5982	Cinko nustatymas kraujyje (Sunkusis metalas) **	20 d.d.	EDTA kraujas 2 ml.	+2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Atominės absorbcijos spektroskopija	Atskiri pamatinių biologinių verčių intervalai asmenims iki 18 metų nėra pateikiami.
VT591	Cinkas**	20 d.d.	Serumas, 2 ml - SPU	10 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	Vengti hemolizės
VT5912	Cinkas**	20 d.d.	Plazma, 2 ml	10 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	Vengti hemolizės
VT592	Titanas**	20 d.d.	Serumas, 2 ml - SPU	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	Atskiri pamatinių biologinių verčių intervalai asmenims iki 18 metų nėra pateikiami.
VT593	Litis	2 val.	Serumas, 1 ml	24 val. +15 - (+25) °C 7 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Kolorimetrisinis	Ėminys renkamas 12 val. po paskutinio ličio preparato naudojimo. Nenaudokite ličio heparinos plazmos. Jeigu mėginį planuojama laikyti ilgiau nei 4 valandas, mėginį reikėtų atskirti nuo ląstelių.
VT5978	Vanadis**	20 d.d.	Serumas, 2 ml - SPU	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	Atskiri pamatinių biologinių verčių intervalai asmenims iki 18 metų nėra pateikiami.
VT594	Jodas**	20 d.d.	Serumas, 4 ml - SPU	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	
VT993	Jodo nustatymas paros šlapime**	20 d.d.	24 val. šlapimas, tyrimui atpilti 50 ml. Nurodyti paros šlapimo kiekį.	7 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	
VT5979	Silicis**	20 d.d.	EDTA kraujas 2 ml	+2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	
LB081	Vario koncentracijos nustatyma	1 d.d.	Serumas, 2 ml	14 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Spektrofotometrisinis (kalorimetrisinis)	
VT5961	Varis (kaip sunkusis metalas)**	20 d.d.	Serumas, 2 ml - SPU	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Induktyviai susietos plazmos masės spektrometrija ICP-MS)	
VT596	Varis paros šlapime (kaip mikroelementas)**	20 d.d.	24 val. šlapimas, tyrimui atpilti 50 ml. Nurodyti paros šlapimo kiekį.	7 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus		Vario koncentracijos nustatymas vienkartinėje šlapimo porcijoje neturi klinikinės diagnostinės vertės.
Vitaminai									
LF542	Holotranskobalaminas (aktyvusis vitaminas B12)	2 val.	Serumas, 1 ml	2 val. +15 – (+25) °C 48 val. +2 – (+8) °C 56 d. -15 – (-25) °C (Galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Tik nevalgusiems 12 val. Vengti tiesioginių saulės spindulių. Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.

LF541	Bendras vitaminas D (25-OH)	3 val.	Serumas, 1 ml	8 val. +20 - (+25) °C 4 d. +2 - (+8) °C 21 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
LF55	Folio rūgštis	3 val.	Serumas, 1 ml	2 val. +20 - (+25) °C 48 val. +2 - (+8) °C 28 d. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Tik nevalgiusiems 12 val. Vengti tiesioginių saulės spindulių. Hemolizė gali žymiai padidinti folio r. reikšmes, todėl hemoliziniai mėginiai nėra tinkami tirti. Mėginiai su ypatingai aukšta bendro baltymo koncentracija (>160 g/l) nėra tinkami tirti. Ligoniams, vartojantiems metotreksatą ar leukovoriną, folio r. tyrimai yra kontraindikuotini dėl kryžminės reakcijos folio r. surišančių baltymų. Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
VT05	Vitaminas A**	20 d.d.	Serumas, 2ml	24 val. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Didelio efetyvumo skysčių chromatografija	Saugoti nuo šviesos! Galima apsukti aliuminio folija.
VT06	beta-Karotinas**	20 d.d.	Serumas, 1 ml Kaip įmanoma greičiau atskirti serumą.	7 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Didelio efetyvumo skysčių chromatografija	Saugoti nuo šviesos! Rekomenduojam apsukti aliuminio folija. 12 val. prieš nevalgyti morkų, persikų ir kitų vaisių, žalios spalvos daržovių.
VT07	Vitaminas B1**	20 d.d.	EDTA kraujas, 2 ml Įskart po paėmimo dėti į šaldytuvą +2 - (+8) °C	7d. +2 - (+8) °C Laikyti tamsoje	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Didelio efetyvumo skysčių chromatografija	Saugoti nuo šviesos! Galima apsukti aliuminio folija.
VT08	Vitaminas B2**	20 d.d.	EDTA kraujas, 2 ml Įskart po paėmimo dėti į šaldytuvą +2 - (+8) °C	7d. +2 - (+8) °C Laikyti tamsoje	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Didelio efetyvumo skysčių chromatografija	Saugoti nuo šviesos! Galima apsukti aliuminio folija.
VT081	Vitaminas B3 (niacinas)**	20 d.d.	Serumas, 1 m	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Didelio efetyvumo skysčių chromatografija	
VT09	Vitaminas B5**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Didelio efetyvumo skysčių chromatografija	Saugoti nuo šviesos! Galima apsukti aliuminio folija.
VT10	Vitaminas B6**	20 d.d.	EDTA plazma, 2 ml Įskart centrifuguoti ir atskirti plazmą	24 val. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-20) °C Laikyti tamsoje	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Didelio efetyvumo skysčių chromatografija	Saugoti nuo šviesos! Galima apsukti aliuminio folija.
VT11	Vitaminas C**	20 d.d.	EDTA plazma Reikalingas SPECIALUS PARUOŠIMAS	1 mėn. -15- (-25) °C Laikyti tamsoje	- 20°C	Ne	Vokietija Cottbus	Skysčių chromatografija kartu su masės spektrografija	1) Tiriamoji medžiaga – EDTA plazma (violetinis mėgintuvėlis); 2) Kraujas ne ilgiau kaip per 2 valandas nuo mėginio paėmimo nucentrifuguojamas; 3) Kaip įmanoma greičiau EDTA plazma (500 µL) perpilama į specialų VITAMINO C tyrimui skirtą mėgintuvėlį, kuris prieš tai buvo užšaldytas; 4) Mėgintuvėlis keletą kartų pavartomas, kol plazma susimaišo su mėgintuvėlyje esančiu stabilizatoriumi; 5) Mėginys užšaldomas; 6) Pristatomas užšaldytas. Visuose mėginio paruošimo etapuose saugoti nuo šviesos!!!
VT12	Vitaminas 1,25- (OH)2- D3**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofermentinis	Saugoti nuo šviesos! Galima apsukti aliuminio folija. Rekomenduojama nevalgyti 12 valandų.
VT13	Vitaminas E**	20 d.d.	Serumas, 2 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Didelio efetyvumo skysčių chromatografija	Saugoti nuo šviesos! Galima apsukti aliuminio folija. Rekomenduojama nevalgyti 12 valandų.
VT14	Vitaminas H (Biotinas)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	4 mėn. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofermentinis	
VT15	Vitaminas K**	20 d.d.	Serumas, 4 ml Įskart centrifuguoti, atpilti serumą, užšaldyti ir saugoti nuo šviesos.	1 mėn. -15- (-25) °C	- 20°C	Ne	Vokietija Cottbus	Didelio efetyvumo skysčių chromatografija	Saugoti nuo šviesos! Galima apsukti aliuminio folija.

Alkoholiai

LN10	Etilo alkoholio koncentracija kraujyje*	2 d.d.	Plazma, 1 ml Necentrifuguoti	2 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VMKL	Fermentinis metodas naudojant alkoholio dehidrogenazę (ADH)	Venos punkcijos vietoje nenaudokite alkoholio ar kitų garuojančių dezinfekantų. Gali būti naudojamas vandeninis Zephiran (benzalkonijaus chloridas), vandeninis Merthiolate (timerozalis) ar jodo-povidonas. Hemolizė – reikšmingo poveikis yra. Penktadieniais tyrimas imamas iki 11val. Šeštadienį tyrimo neimti
Vaistai									
LB78	Karbamazepinas (Carbamazepine)*	2 d.d.	Serumas, 1 ml	7 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Chemoluminiscentinė mikrodalelių imunoanalizė	
LB79	Valproinė rūgštis*	2 d.d.	Serumas, 1 ml	2 d. +2 - (+8) °C 7 d. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Fluorexcentinės poliarizacijos	Valproinės rūgšties tyrimas iš kraujo atliekamas prieš ligoniui gaunant cėlinę vaisto dozę.
VT175	Vigabatriną**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Skysčių chromatografija - masių spektrometrija	
VT48	Laisvas karmitinas**	20 d.d.	Serumas, 4 ml	+2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Fermentinis	
VT34	Digoksinas**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Mikrodalelių imunofermentinis	
VT481	Acilkarnitinas**	20 d.d.	Serumas, EDTA plazma, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	- 20°C	Ne	Vokietija Cottbus	Skysčių chromatografija - masių spektrometrija	
VT501	Klozapino koncentracijos nustatymas kraujo serume**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	+2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Didelio efektyvumo skysčių chromatografija	
VT51	Leflunomido koncentracija kraujyje**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Skysčių chromatografija - masių spektrometrija	
VT57	Levetiracetamas**	20 d.d.	Serumas, 4 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Efektyvioji skysčių chromatografija	Kraujas imamas prieš pat vaisto vartojimą 10 -15 min
VT571	Etosuksimidas**	20 d.d.	Serumas 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Efektyvioji skysčių chromatografija	Kraujas imamas prieš pat vaisto vartojimą 10 -15 min Pusinės eliminacijos laikas 30-60 val.
VT575	Topiramatas**	20 d.d.	Serumas 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Efektyvioji skysčių chromatografija	Kraujas imamas prieš pat vaisto vartojimą 10 -15 min
VT091	Metilmalono rūgštis**	20 d.d.	Serumas,2 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Skysčių chromatografija kartu su masės spektrografija	
VT576	Okskarbazepinas**	20 d.d.	Serumas 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Efektyvioji skysčių chromatografija	Kraujas imamas prieš pat vaisto vartojimą 10 -15 min
VT97	Lamotriginas**	20 d.d.	Serumas, 4 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Skysčių chromatografija - masių spektrometrija	Kraujas imamas prieš pat vaisto vartojimą 10 -15 min
VT271	Diuretikų nustatymas šlapime**	20 d.d.	Šlapimas, 5ml	1 mėn. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Dujų chromatografija - masių spektrometrija	
VT672	Escitalopram vaisto koncentracijos nustatymas**	20 d.d.	Serumas 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	- 20°C	Ne	Vokietija Cottbus	Skysčių chromatografija - masių spektrometrija	Kraujas imamas prieš pat vaisto vartojimą 10 -15 min
VT3301	Amitriptyline vaisto koncentracijos nustatymas**	20 d.d.	Serumas 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	- 20°C	Ne	Vokietija Cottbus	Skysčių chromatografija - masių spektrometrija	Kraujas imamas prieš pat vaisto vartojimą 10 -15 min
VT3302	Citalopram vaisto koncentracijos nustatymas**	20 d.d.	Serumas 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	- 20°C	Ne	Vokietija Cottbus	Skysčių chromatografija - masių spektrometrija	Kraujas imamas prieš pat vaisto vartojimą 10 -15 min
VT3303	Clomipramin vaisto koncentracijos nustatymas**	20 d.d.	Serumas 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	- 20°C	Ne	Vokietija Cottbus	Skysčių chromatografija - masių spektrometrija	Kraujas imamas prieš pat vaisto vartojimą 10 -15 min
VT3304	Clozapine vaisto koncentracijos nustatymas**	20 d.d.	Serumas 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	- 20°C	Ne	Vokietija Cottbus	Skysčių chromatografija - masių spektrometrija	Kraujas imamas prieš pat vaisto vartojimą 10 -15 min
VT3305	Flupentixol vaisto koncentracijos nustatymas**	20 d.d.	Serumas 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	- 20°C	Ne	Vokietija Cottbus	Skysčių chromatografija - masių spektrometrija	Kraujas imamas prieš pat vaisto vartojimą 10 -15 min
VT3306	Haloperidol vaisto koncentracijos nustatymas**	20 d.d.	Serumas 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	- 20°C	Ne	Vokietija Cottbus	Skysčių chromatografija - masių spektrometrija	Kraujas imamas prieš pat vaisto vartojimą 10 -15 min
VT3307	Olanzapin vaisto koncentracijos nustatymas**	20 d.d.	Serumas 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	- 20°C	Ne	Vokietija Cottbus	Skysčių chromatografija - masių spektrometrija	Kraujas imamas prieš pat vaisto vartojimą 10 -15 min
VT3308	Quetiapin vaisto koncentracijos nustatymas**	20 d.d.	Serumas 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	- 20°C	Ne	Vokietija Cottbus	Skysčių chromatografija - masių spektrometrija	Kraujas imamas prieš pat vaisto vartojimą 10 -15 min
VT3309	Risperidone vaisto koncentracijos nustatymas**	20 d.d.	Serumas 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	- 20°C	Ne	Vokietija Cottbus	Skysčių chromatografija - masių spektrometrija	Kraujas imamas prieš pat vaisto vartojimą 10 -15 min
VT3310	Ziprasidon vaisto koncentracijos nustatymas**	20 d.d.	Serumas 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	- 20°C	Ne	Vokietija Cottbus	Skysčių chromatografija - masių spektrometrija	Kraujas imamas prieš pat vaisto vartojimą 10 -15 min
VT200	Venlafaksinas **	20 d.d.	Serumas 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	- 20°C	Ne	Vokietija Cottbus	Skysčių chromatografija - masių spektrometrija	Kraujas imamas prieš pat vaisto vartojimą 10 -15 min

VT3311	Teriflunomido koncentracijos nustatymas**	20 d.d.	Serumas 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	- 20°C	Ne	Vokietija Cottbus	Skysčių chromatografija - masių spektrometrija	Kraujas imamas prieš pat vaisto vartojimą 10 -15 min
Narkotinės medžiagos									
LN011	Narkotinių ir psichotropinių medžiagų koncentracijos nustatymas (tiriami 17 analizių: amfetaminai (AMP), benzodiazepinai (BZD), katinonai (KAT), karfentanilis (CARF), kokainas (COC), fentanilis (FEN), sintetiniai kanabinoidai (SK), lizergo rūgšties dietilamidas (LSD), metilendioksiimetamfetaminas (MDMA), metamfetaminas (MET), morfinas (MOR), marihuana (THC), tramadolis (TRM), tricikliniai antidepresantai (TCA), metadonas (MTD), barbitūrai (BAR), mefedronas hidrochloridas (MEF HCl))	2 d.d.	Rytinis šlapimas, 20 ml	2 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Chromatografinė IFA	Aptikimo laikotarpis šlapime po vartojimo: Amfetaminai 1-3 dienos.; Barbitūratai 4-5 d. (Pentobarbital); 14-21 d. (Phenobarbital); 4-5 d. (Secobarbital). Keletą savačių – vartojant nuolat. Metamfetaminas 1-3 dienos; Metadonas 2-5 dienos; Opiai/morfinas 2-3 dienos; Kokainas 1-4 dienos; MDMA Ecstasy 1-3 dienos; Tricikliniai antidepresantai 2-3 dienos; Benzodiazepinai 3 dienos – vartojant kaip vaistus, 4-6 sav. – vartojant nuolat.
Kiti tyrimai									
VT841	Kopeptinas (CT-proAVP)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofermentinis	Vietoje Antidiurezinio (ADH) hormono (Vazopresino) tyrimo atliekamas Kopeptino (CT-proAVP) tyrimas. Mėginys imamas tik ryte po 8 val. susilaikymo nuo bet kokių skysčių vartojimo
LF471	Interleukinas-6*	1 d.d.	Serumas, 1 ml	1 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	ne	VUL SK	Imunofermentinis	Po mėginio centrifugavimo atskirtas kraujo serumas gabenamas šaltai 2-8° C arba užšaldytas - 20°C temperatūroje
VT705	Adiponektino tyrimas**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofermentinis	
VT1011	Glutatioo peroksidazė**	20 d.d.	EDTA kraujas, 1 ml NECENTRIFUGUOTI	1 mėn. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Fotometrinis	
VT2005	Glutationas**	20 d.d.	EDTA kraujas, 1 ml NECENTRIFUGUOTI	1 mėn. -15- (-25) °C	-20 °C	Ne	Vokietija Cottbus	Skysčių chromatografija kartu su masės spektrografija	
LF71	Homocisteinas	2 val.	Serumas, 1 ml	4 d. +15 - (+25) °C 1 mėn. +2 - (+8) °C 10 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Fotometrinis, ciklinis fermentinis	Pacientai, vartojantys metotreksatą, karbamazepiną, fenitoiną, azoto oksidą, antikonvulsantus ar 6-azuridino triacetatą, dėl sąveikos su Hcy metabolizmu, gali turėti didesnę Hcy koncentraciją. Labai retais atvejais gamapatijos, ypač IgM tipo (Waldenström makroglobulinemija), gali sąlygoti nepatikimus rezultatus. Nerekomenduojama naudoti hemolizuotų, drumstų, labai lipemiškų mėginių.
LF77	Žmogaus placentos augimo faktorius (PIGF)*	2 d.d.	Serumas, 1 ml	48 val. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	ECLIA	
LF78	Tirpi fins tipo tirozinkinazė-1 (sFlt-1)*	2 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. +2 - (+8) °C 6 mėn.-15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	ECLIA	
LF781	sFlt-1/PIGF santykis*	2 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. +2 - (+8) °C 6 mėn.-15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Apskaičiuojamas	Norint apskaičiuoti santykį reikia užsakyti šiuos tyrimus: 1. sFlt-1; 2.PIGF.
LF74	Neščiųjų tyrimas (nuo II trimestro) dėl Dauno sindromo, trisomijos 18 ir nervinio vamzdelio defekto (PRISCA II)	7 d.d.	Serumas, 1 ml	3 d. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Atliekamas TREČIADIENIAIS BŪTINA SPECIALI SIUNTIMO FORMA ir ECHOSKOPIJOS DUOMENYS.

LF741	Neščių tyrimas (nuo I-jo trimestro 11-13+6 d. sav.) dėl Dauno bei Edward's ir Patau's sindromų rizikos vertinimo (PRISCA I)	7 d.d.	Serumas, 1 ml	8 d. +2 - (+8) °C 10 mėn.-15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Atliekamas TREČIADIENIAIS BŪTINA SPECIALI SIUNTIMO FORMA ir ECHOSKOPIJOS DUOMENYS. Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
VT16	Bendras prokalogeno tipo propeptidas (PINP)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	2 d. +15 - (+25) °C 1 mėn. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ECLIA	Kaulų metabolizmui poveikį gali daryti citotoksiškų vaistų vartojimas. Interpretuojant šiais preparatais gydomų pacientų tyrimo rezultatus būtina į tai atsižvelgti.
VT231	Aldolazė**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Fotometrija	
VT24	Q10**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus		Saugoti nuo šviesos! Galima apsukti aliuminio folija.
VT39	Porfirinų diferenciacija + porfobilinogenas**	20 d.d.	24 val. šlapimas, tyrimui atpilti 50 ml. Nurodyti paros šlapimo kiekį.	+2 - (+8) °C, nešaldyti	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Fotometrins	
VT47	Gliukozė-6 fosfat dehidrogenazė**	20 d.d.	EDTA kraujas, 1 ml Iškart po paėmimo dėti į šaldytuvą +2 - (+8) °C	(+2 +8)	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Fluoro-fermentinis- imunologinis	
VT55	Histaminas plazmoje**	20 d.d.	EDTA plazma, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
VT64	TK Timidin kinazė**	20 d.d.	Serumas, 2 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	CLIA	
VT701	Laktoferinas**	20 d.d.	Išmatos, nedidelis kiekis	1 mėn. -15- (-25) °C	-20 °C	Ne	Vokietija Cottbus		
VT74	Angiotenziną konvertuojantis enzimaz (ACE)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Fotometrinis	Vengti hemolizės, iš kart po sukresėjimo, nucentrifuguoti ir atskirti serumą. 4 sav. prieš mėginio paėmimą nutraukti visus vaistus, kurie slopina šio fermento išsiskyrimą
VT782	Antikūnai prieš GABA (gamma-amino sviesto rūgšties) B1 receptorių**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofluorescentinis	
VT804	Antikūnai prieš 1 ir 3 tipo poliomielito virusą**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	7 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Komplemento surišimo reakcija	
VT868	Baltymas 14-3-3**	20 d.d.	Likvoras, 2 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunologinis	
VT92	Riebalų rūgščių nustatymas**	30 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Dujinė chromatografija, sujungta su masės spektroskopija	
VT921	Išplėstinis riebalų rūgščių profilis (MCFA, LCFA, VLCFA, omega-3, omega-6, šakotosios ir trans RR)**	30 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Dujinė chromatografija, sujungta su masės spektroskopija	
VT98	Diaminooksidazė**	20 d.d.	Serumas, 2 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	Slopinamas DAO poveikis pasireiškia, pavyzdžiui dėl cheminių medžiagų tokių kaip alkoholis ar narkotikai (Acetilcisteinas, ambroxol, Aminofilinas, Amitriptilinas, chlorochinu, klavulano rūgštis, izoniazidas, dipyrone, metoklopramidas, propafenono, verapamilis).
VT99	Aminorūgštys **	20 d.d.	EDTA plazma, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Didelio efektyvumo skysta chromatografija	Labai svarbu, kad kraujas būtų imamas nevalgius arba praėjus bent 4-6 valandoms po valgio
VT102	Melatoninas**	20 d.d.	Serumas, 2 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Skysčių chromatografija kartu su masės spektrografija	
VT400	Cinko protoporfirinas **	20 d.d.	EDTA kraujas, 1 ml	+2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Didelio efektyvumo skysčio chromatografija	Saugoti nuo šviesos.

LF84	suPAR (tirpūsiai urokinazės tipo plazminogeno aktyviklio receptoriai)*	12 d.d.	EDTA Plazma 1 ml	24 val. +20 - (+25) °C 3 d. +2 - (+8) °C 24 mėn. -15 - (-20) °C (galima šaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Ne	Medicina Practica		
VT103	Alfa galaktozidazė**	20 d.d.	Serumas, 2 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Fluorometrinis	
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI									
TT26	Anti B2 IgG - Antikūnai beta2 glikoproteinui 1 IgG*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	8 val. +20 - (+25) °C 72 val. +2 - (+8) °C 2 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Imunocheminis	
TT28	Anti B2 IgA - Antikūnai beta2 glikoproteinui 1 IgA*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	8 val. +20 - (+25) °C 72 val. +2 - (+8) °C 2 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Imunocheminis	
TT27	Anti B2 IgM - Antikūnai beta2 glikoproteinui 1 IgM*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	8 val. +20 - (+25) °C 72 val. +2 - (+8) °C 2 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Imunocheminis	
TT31	Antikardiolipidiniai antikūnai IgA*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	8 val. +20 - (+25) °C 72 val. +2 - (+8) °C 2 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Imunocheminis	
TT30	Antikardiolipidiniai antikūnai IgM*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	8 val. +20 - (+25) °C 72 val. +2 - (+8) °C 2 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Imunocheminis	
TT29	Antikardiolipidiniai antikūnai IgG*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	8 val. +20 - (+25) °C 72 val. +2 - (+8) °C 2 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Imunocheminis	
VT22	IgG endomiziumo antikūnai (IgG Ema)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofluorescentinis	
VT221	IgA endomiziumo antikūnai (IgA Ema)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofluorescentinis	
LF75	Antikūnai prieš audinių transglutaminazę Anti-tTG IgA (dėl celiakinės ligos ištyrimo)	1 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip	ELISA		ŠEŠTADIENIAIS TYRIMAS NEATLIEKAMAS Vengti hemolizės ar lipemijos
LF751	Antikūnai prieš audinių transglutaminazę Anti-tTG IgG (dėl celiakinės ligos ištyrimo)	1 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip	ELISA		ŠEŠTADIENIAIS TYRIMAS NEATLIEKAMAS Vengti hemolizės ar lipemijos
LF80	Anti gliadininiai antikūnai IgA	1 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 6 mėn.-15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip	ELISA		ŠEŠTADIENIAIS TYRIMAS NEATLIEKAMAS Vengti hemolizės ar lipemijos
LF81	Anti gliadininiai antikūnai IgG	2 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 6 mėn.-15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip	ELISA		ŠEŠTADIENIAIS TYRIMAS NEATLIEKAMAS Vengti hemolizės ar lipemijos
LF83	Antikūnai prieš deamidintus gliadino baltymo epitopus IgA (Anti-DGP-IgA)	2 d.d.	Serumas, 1 ml	4 d. +2 - (+8) °C 30 mėn.-15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip	ELISA		ŠEŠTADIENIAIS TYRIMAS NEATLIEKAMAS Vengti hemolizės ar lipemijos
LF831	Antikūnai prieš deamidintus gliadino baltymo epitopus IgG (Anti-DGP-IgG)	1 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 6 mėn.-15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip	ELISA		ŠEŠTADIENIAIS TYRIMAS NEATLIEKAMAS Vengti hemolizės ar lipemijos
LF011	Antikūnai prieš tirootropino receptoriai (Anti-TTHR)	7 d.d.	Serumas, 1 ml	7 val. +20 - (+25) °C 6 d. +2 - (+8) °C 12 mėn. -15 - (-25) °C (galima šaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip	ECLIA		Atliekamas TREČIADIENIAIS Nenaudoti lipeminio ir hemolizuoto serumo. Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val. Nenaudokite mėginių, paimtų iš pacientų, kurie gydomi heparinu. Frakcionuotas heparinas (Clexane) tyrimui įtakos neturi, kai jo koncentracija siekia iki 5 IU/mL.
LF083	Antitiroglobulino antikūnai (Anti-Tg)	2 val.	Serumas, 1 ml	4 d. +20 - (+25) °C 4 d. +2 - (+8) °C 2 mėn. -15 - (-25) °C (galima šaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip	ECLIA		TG koncentracija > 2000 ng/mL gali lemti klaidingai padidėjusią anti-Tg koncentraciją. Šiuo atveju atitinkamos anti-Tg vertės neturėtų būti priskiriamos pacientų mėginiams. Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
LF07	Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (ATPO)	2 val.	Serumas, 1 ml	8 d. +20 - (+25) °C 8 d. +2 - (+8) °C 24 mėn. -15 - (-20) °C (galima šaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip	ECLIA		Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.

VT772	Anti ICA (autoantikūnai prieš kasos salelių b - ląsteles)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofluorescentinis	
VT77	Anti gliutamo rugšties dekarboksilazes antikunai (anti-GAD)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
VT771	Antikūnai prieš insuliną (IAA)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Radioimuninis	
VT773	Anti IA2 (autoantikūnai prieš tirozinfosotaze)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofluorescentinis	
VT79	Antikūnai prieš akvaporiną 4**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Radioimunoprecipitacijos	
VT791	Antikūnai prieš acetilcholino receptorių *	14 d.d.	Serumas, 1 ml	8 val. +20 - (+25) °C 72 val. +2 - (+8) °C 2 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Imunocheminis	
TT25	Antikūnai prieš gangliono acetilcholino receptorių**	20 d.d.	Serumas, 2 ml	7 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Radioimunoprecipitacijos	
VT2001	Antikūnai prieš Annexin V **	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus		
VT2002	Antikūnai prieš Rekoveriną **	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus		
VT2006	Malondialdehidas (MDA)**	20 d.d.	EDTA plazma 3 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	HPLC	
LB31	Antistreptolizinas O (ASLO)	2 val.	Serumas, 1 ml	8 val. +2 - (+25) °C 48 d. +2 - (+8) °C Ilgiau -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Imunoturbidimetris	Retais atvejais gamapatijos (dauginė mieloma, Waldenstromo makroglobulinemija) gali stipriai padidinti ASL O koncentraciją.
TT021	Antinuklearinių antikūnų (ANA) atrankos tyrimas	2 d.d.	Serumas, 1 ml	4 d. +2 - (+8) °C Ilgiau -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ELISA	ŠEŠTADIENIAIS TYRIMAS NEATLIEKAMAS Vengti hemolizės ar lipemijos. Patvirtinimui užsakomas TT02 tyrimas, kuris atliekamas VUL SK.
TT021	Antinuklearinių antikūnų tyrimas (patvirtinamasis, užsako laboratorijos darbuotojas)*	5 d.d.	Serumas, 1 ml	8 val. +20 - (+25) °C 72 val. +2 - (+8) °C 2 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	NIF	PATVIRTINAMASIS TYRIMAS. Užsakomas gavus teigiamą ANA rezultatą.
TT031	Antineutrofilinės citoplazmos antikūnų (ANCA) atrankos tyrimas	1 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ELISA	ŠEŠTADIENIAIS TYRIMAS NEATLIEKAMAS Vengti hemolizės ar lipemijos. Patvirtinimui užsakomas TT03 tyrimas, kuris atliekamas VUL SK.
TT03	Antineutrofilinės citoplazmos antikūnų tyrimas* (patvirtinamasis, užsako lab. darbuotojas)	5 d.d.	Serumas, 1 ml	8 val. +20 - (+25) °C 72 val. +2 - (+8) °C 2 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	NIF	PATVIRTINAMASIS TYRIMAS. Užsakomas gavus teigiamą ANCA rezultatą.
TT05	Atikūnų prieš dvispiralę DNR (anti-dsDNR) tyrimas*	5 d.d.	Serumas, 1 ml	8 val. +20 - (+25) °C 72 val. +2 - (+8) °C 2 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Imunocheminis	Vengti hemolizės ar lipemijos
LF76	Antikūnai prieš ciklinį citrulininį peptidą (Anti-CCP)	2 val.	Serumas, 1 ml	3 d. +20 - (+25) °C 8 d. +2 - (+8) °C 12 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Testas gali būti klaidingai neigiamas ligoniams su hipergamaglobulinemija. Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
LB30	Reumatoidinis faktorius (RF)	2 val.	Serumas, 1 ml	24 val. +20 - (+25) °C 8 d. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-20) °C (galima šaldyti tik vieną kartą)	+2 - (+8) °C	Taip		Imunoturbidimetris	Retais atvejais gamapatijos, ypač IgM (Waldenstromo makroglobulinemija) gali įtakoti rezultatus. Yra tikimybė, kad kitos medžiagos ir/ar veiksniai gali daryti poveikį tyrimui ir lemti nepatikimus rezultatus
VT18	Autoantikūnai IgG Scl 70 (AK branduolio fermentui DNR topoizomerazei I)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunoblotas	
VT201	Antikūnai prieš raumenims specifinę tirozinkinazę (Anti-MuSK)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
VT40	Antikūnai prieš lygiuosius raumenis (SMA)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofluorescentinis	
VT41	Antikūnai prieš kepenų-inkstų mikrosomas (LKM)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofluorescentinis	
VT859	Antikūnai prieš I tipo kepenų citoplazmos antigeną (anti-LC1)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus		

TT01	Ląstelinio imuniteto nustatymas (CD3, CD4, CD8, CD16, CD19)*	10 d.d.	EDTA kraujas, 1 ml. Necentrifuguoti	48 val. +15 - (+25) °C. Geriausia tyrimą atlikti tą patį dieną (per 12 val.)	+15 - (+25) °C	Ne	NVSPL	Tekmės citometrija, tiesioginė imuno fluorescencija	Mėginių prisatymo adreas - Gėlių g. 9, Vilnius
LB73	Komplementas C3c*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	8 d. +2 - (+8) °C 8 d. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Imunoturbidimetris	
LB74	Komplementas C4*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	8 d. +2 - (+8) °C 8 d. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Imunoturbidimetris	
LB75	Komplemento C1 esterazės inhibitorius*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	1 m. -15 - (-20) °C	-20 °C	Ne	VUL SK	Imunonefelometris	Po centrifugavimo atskirtas kraujo serumas gabenamas ledų vonelėje.
LB751	C1 esterazės inhibitoriaus aktyvumo nustatymas*	1 mėn.	Serumas, 1 ml	8 d. +2 - (+8) °C 1 m. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Imunonefelometris	
TT032	Autoantikūnų prieš neuronus (Anti-Hu, Anti-Ri, Anti-Yo, Anti-CV2, Anti-PNMA2) patvirtinantis tyrimas*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	8 val. +20 - (+25) °C 72 val. +2 - (+8) °C 2 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Imunoblotas	
TT06	Antikūnų prieš glomerulų bazinę membraną (anti-GMB) tyrimas*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	ELISA	
TT07	Antikūnai prieš skersaružius raumenis**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Radioreceptorių analizė (RRA)	
TT14	Antimitochondriniai antikūnai (AMA)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imuno fluorescencinis	
TT141	Antimitochondriniai antikūnai prieš subvienetą M2 (AMA M2)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
TT16	Ekstrahuotų branduolio antigenų antikūnai (ENA AK)*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	14 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Juostelinė imunofermentinė analizė	
TT32	Antikūnų prieš autoimuninių miozیتų ir uždegiminių miopatijų antigenus nustatymas imunoblotu*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	8val. +20 - (+25) °C 72 val. +2 - (+8) °C 2 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Imunoblotas	
TT161	Tyrimai dėl antfosfolipidinio sindromo (LA1;LA2; AK prieš kardioliną IgG, IgM; AK prieš beta2 - glikoproteiną 1 IgG)*	7 d.d.	Serumas, 1 ml + Citrato plazma (žydras mėgintuvėlis), 1 ml	Serumas: 8 val. +20 - (+25) °C 48 val. +2 - (+8) °C Ilgiau -15 - (-20) °C Plazma: 4 val. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-20) °C	Serumas: +2 - (+8) °C Plazma: -20 °C	Ne	VUL SK	Imunologinis +koaguliometris	Po centrifugavimo atskirta ir užšaldyta kraujo plazma (žydras mėgintuvėlis) gabenama ledų vonelėje.
TT17	Cirkuliuojantys imuniniai kompleksai*	5 d.d.	Serumas, 1 ml	8 val. +15 - (+25) °C 72 val. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Cheminis instrumentinis	
TT19	Aktyvuoto baltymo C rezistentiskumas - APCR *	6 d.d.	Citrato plazma, 1 ml	8 val. +20 - (+5) °C 1 mėn. -15 - (-20) °C	-20 °C	Ne	VUL SK	Koaguliometris	mėgintuvėlių kraujo plazma gabenama pristatoma užšaldyta. Pastaba: visas kraujo ėminys (visas vakuuminis mėgintuvėlis) gali būti gabenamas/pristatomas standartinėmis sąlygomis, 20 ± 5° C temperatūroje, tačiau šie mėgintuvėliai turi būti naudojami per 2 valandas.
TT20	Lupus Antikoaguliantas 1 (LA1)*	7 d.d.	Citrato plazma, 1 ml	4 val. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-20) °C	-20 °C	Ne	VUL SK	Koaguliometris	Po centrifugavimo atskirta ir užšaldyta kraujo plazma (žydras mėgintuvėlis) gabenama ledų vonelėje.
TT21	Lupus Antikoaguliantas 2 (LA2)*	7 d.d.	Citrato plazma, 1 ml	4 val. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-20) °C	-20 °C	Ne	VUL SK	Koaguliometris	Po centrifugavimo atskirta ir užšaldyta kraujo plazma (žydras mėgintuvėlis) gabenama ledų vonelėje.
TT24	Autoimuninio encefalito antikūnų mozaika (NMDA, AMPA, VGKC asocijuotas CASPR2, LGI1) Autoantikūnų prieš neuronų paviršiaus antigenus nustatymas*	20 d.d.	Serumas, 1 ml	48 val. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Imuno fluorescencinis	
TT10	Žmogaus leukocitų II klasės antigenų (HLA-DR, DQ) nustatymas*	7 d.d.	Heparinizuota ar K3EDTA 2 mėg.	24 val. +2 - (+8) °C	+15 - (+25) °C	Ne	VUL SK	Polimerazės grandininė reakcija	
TL421	ŽLA haplotipų DQ2/DQ8 lemiančių celiakinės ligos vystymąsi, nustatymas (PGR)	7 d.d.	EDTA kraujas, 3 ml	72 val. +2 - (+8) °C 1 mėn. -20 °C	+2 - (+8) °C	Taip		PGR+ atvirkštinė hibridizacija	Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas
TT04	Žmogaus leukocitų I klasės antigeno HLA B27 nustatymas	7 d.d.	EDTA kraujas, 3 ml	72 val. +2 - (+8) °C 1 mėn. -20 °C	+2 - (+8) °C	Taip		PGR+ atvirkštinė hibridizacija	Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas
VT28	Antikūnai prieš parietalines ląsteles**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
VT061	Antikūnai prieš vidinį faktorių**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	

VT332	Antikūnai prieš 3-hidroksi-3-metilglutaril-koenzimo A reduktazę (Anti-HMGCR)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
VT01	Anti gangliozidiniai antikūnai AntiGM1 IgG**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	3 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
VT011	Anti gangliozidiniai antikūnai AntiGM1 IgM**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	3 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
VT02	Anti gangliozidiniai antikūnai AntiGM2 IgG**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	3 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
VT021	Anti gangliozidiniai antikūnai AntiGM2 IgM**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	3 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
VT03	Anti gangliozidiniai antikūnai AntiGM3 IgG**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	3 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
VT031	Anti gangliozidiniai antikūnai AntiGM3 IgM**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	3 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
VT858	Eozinofilų katjoninis baltymas (ECP)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	FEIA	
VT463	Autoantikūnai prieš spermatozoidus**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofluorescentinis	
VT281	Antikūnai prieš cinko transportinį baltymą (ZnT-8A)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
VT83	Anti-Saccharomyces Cerevisiae antikūnai (ASCA)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofluorescentinis	
VT863	Anti-Hu**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofluorescentinis	
VT865	Antikūnai prieš Glicino receptorių A1**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus		
VT867	Anti LGI-1 (antikūnai prieš leucino daug turinčią glioma inaktyvuotą1)*)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofluorescentinis	
VT577	Anti-MAG antikūnų tyrimas**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
VT869	Antikūnai prieš mielino oligodendrocito glikoproteiną – Anti-MOG**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofluorescentinis	
VT88	Anti-Sm (Smith antikūnai)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	FIA	
VT881	Anti-LRP4 (antikūnai prieš baltymą susijusį su mažo tankio lipoproteinų receptoriais)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofluorescentinis	
VT882	Anti –P/Q tipo anti-VGCC (nuo įtampos priklausomi kalcio kanalų antikūnai anti-P/Q tipo)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus		
VT883	Anti –N tipo anti-VGCC (nuo įtampos priklausomi kalcio kanalų antikūnai anti-N tipo)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus		
VT94	Antikūnai prieš kepenų antigeną (SLA)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunoblotas	
TT52	Anti-PLA2R ir anti-THSD7A tyrimas (Membrininės nefropatijos mozaika)*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	48 val. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Imunofluorescentinis	
Alergenams specifinių IgE klasės antikūnų nustatymas									
LF64	Alergenui specifinio IgE nustatymas (pagal pateikiamą alergenų sąrašą)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	3 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ECLIA	Pastabose nurodyti alergenų kodą.

LF647	Įkvepiamųjų alergenų rinkinys MINI	4 d.d.	Serumas, 1 ml	13 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip	Imunoblotos	Atliekamas ANTRADIENIAIS ir KETVIRTADIENIAIS g1 Kvapioji gardūnytė g2 Paprastoji šnažolė g3 Pašarinis motiejukas g12 Rugiai t2 Alksnis t3 Beržas t4 Lazdynas t7 Ažuolas w1 Kietinė ambrozija w6 Paprastasis kietis w9 Siauralapis gyslotis d1 Dermatohpagoides pteronyssinus (namų dulkių erkutė) d2 Dermatophagoides farinae (namų dulkių erkutė) e1 Katė e2 Šuo e3 Arklys m1 Penicillium notatum m2 Cladosporium herbarum m3 Aspergillus fumigatus m6 Alternaria alternata CCD žymuo
LF649	Mišrus alergenų rinkinys	4 d.d.	Serumas, 1 ml	13 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip	Imunoblotos	Atliekamas ANTRADIENIAIS ir KETVIRTADIENIAIS gx Žolės mišinys 2 (motiejukas, rugiai) t3 Beržas w6 Paprastasis kietis d1 Dermatohpagoides pteronyssinus (namų dulkių erkutė) d2 Dermatophagoides farinae (namų dulkių erkutė) e1 Katė e2 Šuo e3 Arklys m2 Cladosporium herbarum m3 Aspergillus fumigatus m6 Alternaria alternata f1 Kiaušinio baltymas f75 Kiaušinio trynys f2 Karvės pienas f3 Menkė f76 alfa-Laktalbuminas f77 beta-Laktalbuminas f78 Kazėinas e204 Jaučio serumo albuminas f4 Kvietiniai miltai f9 Ryžiai f14 Sojų pupelės f13 Žemės riešutai f17 Lazdyno riešutai f31 Morkos f35 Bulvės f49 obuoliai CCD žymuo
LF650	Maisto alergenų rinkinys MINI	4 d.d.	Serumas, 1 ml	13 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip	Imunoblotos	Atliekamas ANTRADIENIAIS ir KETVIRTADIENIAIS f1 Kiaušinio baltymas f75 Kiaušinio trynys f2 Karvės pienas f45 Mielės f4 Kvietiniai miltai f5 Ruginiai miltai f9 Ryžiai f14 Sojų pupelės f13 Žemės riešutai f17 Lazdyno riešutai f20 Migdolai f49 obuoliai f84 Kiviai f237 Abrikosai f25 Pomidorai f31 Morkos f35 Bulvės f85 Salierai f3 Menkė f23 Krabai CCD žymuo

LF6502	Maisto alergenų rinkinys MAXI	4 d.d.	Serumas, 1 ml	13 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Imunoblotos	Atliekamas ANTRADIENIAIS ir KETVIRTADIENIAIS f1 Kiaušinio baltymas; f75 Kiaušinio trynys; f2 Karvės pienas; f169 Karvės pienas UHT; f78 Kazėinas; f4 Kvietiniai miltai; f79 Gliutenas; f9 Ryžiai; f14 Sojų pupelės; f10 Sezamas; f13 Žemės riešutai; f17 Lazdyno riešutai; f144 Pistacijos; u87 Saulėgrąžos; f222 Moliūgų sėklos; f33 Apelsinas; f44 Braškės; f49 obuoliai; f92 Bananai; f84 Kiviai; f146 Šilkmedžio uogos; f328 Figos; f25 Pomidoras; f31 Morkos; f35 Bulvės; f48 Svogūnas; f95 Persikai; f97 Vyšnios; f122 Alyvuogės; f132 Pupelės; fs14 Žuvų mišinys: menkė, silkė, skumbė, plekšnė; fs10 Vėžiagyvių mišinys: omaras, austrės, moliuskai; fs43 Mėsos mišinys: jautiena, aviena; f83 Vištiena; CCD žymuo
LF6512	Atopinių alergenų rinkinys MAXI	4 d.d.	Serumas, 1 ml	13 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Imunoblotos	Atliekamas ANTRADIENIAIS ir KETVIRTADIENIAIS w6 Paprastas kietis; w9 Siauralapis gyslotis; w103 Dilgelė; w203 Rapsas; t3 Beržas; t4 Lazdynas; t11 Platanas; g6 Motiejukas; gs21 Grūdinių augalų žiedadulkių mišinys: rugiai, avižos, miežiai, kviečiai; e1 Katė; e2 Šuo; e3 Arklys; e4 Karvė; e82 Triušis; es2 Plunksnų mišinys: vištų, anėlių, žąsų; ds1 Dulkių erkelių mišinys:Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae; ms1 Pelėsiu mišinys: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata; m5 Candida albicans; f245 Kiaušinis; f2 Karvės pienas; f81 Čederio sūris; f13 Žemės riešutai; f14 Sojų pupelės; f17 Lazdyno riešutai; f256 Graikiški riešutai; f4 Kvietiniai miltai; f12 Žirneliai; f15 Baltos pupelės; f44 Braškės; fs32 Citrusinių vaisių mišinys: greipfruktas, citrina, apelsinas, mandarinas; f26 Kiauliena; f27 Jautiena; f83 Vištiena; f49 obuoliai; f3 Menkė; CCD žymuo
LF6542	ALEX AIR įkvėpiamųjų alergenų rinkinys	7d.d.	Serumas, 1 ml	7 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Imunologinis	Tinkamas ir kapiliarinis kraujas. 0.5 ml
LF6543	ALEX FOOD maisto alergenų rinkinys	7 d.d.	Serumas, 1 ml	7 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Imunologinis	Tinkamas ir kapiliarinis kraujas. 0.5 ml
LF6544	ALEX ^o išsamus specifinių IgE alergijų tyrimas	7 d.d.	Serumas, 1 ml	7 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Imunologinis	Tinkamas ir kapiliarinis kraujas. 0.5 ml
KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMAI									
VT161	Trombocitų funkcijos tyrimas (COL/EPI)*	1 d.d.	Natrio citratu/žydrų kamšteliu	4 val. +15 - (+25) °C	+ 15 - (+25) °C	Ne	VUL SK	Agregometrija visame kraujyje	Tyrimas imamas kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 11:30 val. Visas kraujo ėminys (visas vakuuminis mėgintuvėlis) gabenamas/pristatomas standartinėmis sąlygomis, +20 ± 5° C temperatūroje ir pristatomas ne vėliau kaip per 2 val. nuo kraujo ėminio paėmimo. Pastaba: tyrimui atlikti būtina pristatyti du vakuuinius mėgintuvėlius.
VT162	Trombocitų funkcijos tyrimas (COL/ADP)*	1 d.d.	Natrio citratu/žydrų kamšteliu	4 val. +15 - (+25) °C	+ 15 - (+25) °C	Ne	VUL SK	Agregometrija visame kraujyje	Tyrimas imamas kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 11:30 val. Visas kraujo ėminys (visas vakuuminis mėgintuvėlis) gabenamas/pristatomas standartinėmis sąlygomis, +20 ± 5° C temperatūroje ir pristatomas ne vėliau kaip per 2 val. nuo kraujo ėminio paėmimo. Pastaba: tyrimui atlikti būtina pristatyti du vakuuinius mėgintuvėlius.
VT163	Protrombino laikas (PL) Owren metodu *	1 d.d.	Natrio citratu/žydrų kamšteliu	24 val. +15 - (+25) °C	+ 15 - (+25) °C	Ne	VUL SK	Koagulometrinis	Tyrimas imamas tik darbo dienomis. Po kraujo ėminio centrifugavimo atskirta į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo mėgintuvėlį kraujo plazma gabenama/pristatoma standartinėmis sąlygomis, +20 ± 5° C temperatūroje.
VT164	Aktyvininto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) maišymo mėginys (Rosnerio indeksas)*	1 d.d.	Natrio citratu/žydrų kamšteliu	4 val. +15 - (+25) °C	+ 15 - (+25) °C	Ne	VUL SK	Koagulometrinis	Tyrimas imamas kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 11:30 val. Visas kraujo ėminys (visas vakuuminis mėgintuvėlis) gabenamas/pristatomas standartinėmis sąlygomis, +20 ± 5° C temperatūroje ir pristatomas ne vėliau kaip per 2 val. nuo kraujo ėminio paėmimo. Po kraujo ėminio centrifugavimo atskirta į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo mėgintuvėlį kraujo plazma gabenama/pristatoma standartinėmis sąlygomis, +20 ± 5° C temperatūroje ne vėliau kaip per 2 val. nuo kraujo ėminio paėmimo.

VT165	Trombino laikas*	1 d.d.	Natrio citratu/žydrų kamšteliu	8 val. +15 - (+25) °C	+ 15 - (+25) °C	Ne	VUL SK	Koagulometrinis	Tyrimas imamas kiekvieną darbo dieną nuo 7 iki 11:30 val. Po kraujo ėminio centrifugavimo atskirta į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo mėgintuvėlį kraujo plazma gabenama/pristatoma standartinėmis sąlygomis, +20 ± 5° C temperatūroje.
VT166	Anti-Xa tyrimas*	1 d.d.	Natrio citratu/žydrų kamšteliu	2 val. +15 - (+25) °C	+ 15 - (+25) °C Ėminys priimamas tik V.Grybo g. 32A, Vilnius	Ne	VUL SK	Chromogeninis	Tyrimas imamas kiekvieną darbo dieną nuo 11 iki 11:30 val. Pranešame į laboratoriją. Po kraujo ėminio centrifugavimo atskirta į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo mėgintuvėlį kraujo plazma gabenama/pristatoma standartinėmis sąlygomis, +20 ± 5° C temperatūroje ir pristatoma ne vėliau kaip per 1 val. 30 min. nuo kraujo ėminio paėmimo.
VT167	Fibrinogeno antigeno tyrimas nefelometrinium metodu*	5 d.d.	Natrio citratu/žydrų kamšteliu	1 metai -15 - (-20) °C	- 15 - (-20) °C	Ne	VUL SK	Nefelometrinis	Po kraujo ėminio centrifugavimo atskirta į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo mėgintuvėlį kraujo plazma gabenama/pristatoma užšaldyta –20 ± 5° C temperatūroje. Pastaba: pristatyti atitirpę mėginiai netinkami tyrimui atlikti ir bus vertinami kaip neatitiktis.
VT168	Krešėjimo faktorius VIII nustatymas*	5 d.d.	Natrio citratu/žydrų kamšteliu	4 val. +15 - (+25) °C 15 d. -15 - (-20) °C	+ 15 - (+25) °C	Ne	VUL SK	Koagulimetrinis	Tyrimas imamas kiekvieną darbo dieną nuo 11 iki 11:30 val. Pranešame į laboratoriją. Po kraujo ėminio centrifugavimo atskirta į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo mėgintuvėlį kraujo plazma gabenama/pristatoma užšaldyta –20 ± 5° C temperatūroje. Pastaba: pristatyti atitirpę mėginiai netinkami tyrimui atlikti ir bus vertinami kaip neatitiktis.
LB46	Protrombino -fibrinogeno (II-V-VII-X) aktyvumas Quik metodu	2 val.	Citrato plazma, 1 ml	24 val. +15 - (+25) °C	+ 15 - (+25) °C	Taip		Kviko (Quick)	Centrifuguoti kaip galima greičiau po ėminio paėmimo. Prieš tiriant laikyti tik uždarytame mėgintuvėlyje.
LB47	Aktyvuotas dalinis tromboplastinis laikas (ADTL)	2 val.	Citrato plazma, 1 ml	4 val. +15 - (+25) °C 2 sav. -15 - (-20) °C	+15 - (+25) °C	Taip		Vidinės krešėjimo sistemos faktoriai aktyvuojami inkubuojant plazmą optimaliu fosfolipidų kiekiu ir paviršiaus aktyvatoriumi. Kalcio jonų priemaiša sukelia krešėjimo procesą ir matuojamas krešėjimo laikas.	Centrifuguoti kaip galima greičiau po ėminio paėmimo. Prieš tiriant laikyti tik uždarytame mėgintuvėlyje. Jei netiriama iš karto, plazma turi būti atskirta nuo eritrocitų plastikiniu antgaliu. Plazma, turinti mažai trombocitų, gali būti šaldoma iki 2 sav. -20 °C. Jei pirminis mėginys paimtas/pristatytas į laboratoriją lėkus mažiau nei 1 val. iki laboratorijos darbo pabaigos, mėginys nepriimamas tirti.
LB491	Baltymo C koncentracijos nustatymas*	7 d.d.	Citrato plazma, 1 ml	8 val. +15 - (+25) °C 30d. -15 - (-20) °C	-20 °C	Ne	VUL SK	Koagulimetrinis	Po centrifugavimo atskirta į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo vienkartinį mėgintuvėlį kraujo plazma gabenama/pristatoma užšaldyta
LB492	Baltymo S koncentracijos nustatymas*	7 d.d.	Citrato plazma, 1 ml	4 val. +15 - (+25) °C 30d. -15 - (-20) °C	-20 °C	Ne	VUL SK	Koagulimetrinis	Po centrifugavimo atskirta į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo vienkartinį mėgintuvėlį kraujo plazma gabenama/pristatoma užšaldyta.
VT605	Trombocitų agregacija visame kraujyje su trombino receptorių aktyvuojančiu peptidu (TRAP)*	2 d.d.	Visas kraujas su heparinu	4 val. +15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	VUL SK	Impedanso agregometrijos	Visas kraujo ėminys (visas vakuuminis mėgintuvėlis) gabenamas/pristatomas standartinėmis sąlygomis 15-25°C temperatūroje. Ėminį pristatyti kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 2val. Nuo kraujo ėminio paėmimo. Užšaldyti negalima.
VT604	Trombocitų agregacija visame kraujyje su ristocetinu*	2 d.d.	Visas kraujas su heparinu	4 val. +15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	VUL SK	Impedanso agregometrijos	Visas kraujo ėminys (visas vakuuminis mėgintuvėlis) gabenamas/pristatomas standartinėmis sąlygomis 15-25°C temperatūroje. Ėminį pristatyti kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 2val. Nuo kraujo ėminio paėmimo. Užšaldyti negalima.
VT603	Trombocitų agregacija visame kraujyje su kolagenu*	2 d.d.	Visas kraujas su heparinu	4 val. +15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	VUL SK	Impedanso agregometrijos	Visas kraujo ėminys (visas vakuuminis mėgintuvėlis) gabenamas/pristatomas standartinėmis sąlygomis 15-25°C temperatūroje. Ėminį pristatyti kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 2val. Nuo kraujo ėminio paėmimo. Užšaldyti negalima.
VT602	Trombocitų agregacija visame kraujyje su arachidono rūgštimi (ASPI)*	2 d.d.	Visas kraujas su heparinu	4 val. +15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	VUL SK	Impedanso agregometrijos	Visas kraujo ėminys (visas vakuuminis mėgintuvėlis) gabenamas/pristatomas standartinėmis sąlygomis 15-25°C temperatūroje. Ėminį pristatyti kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 2val. Nuo kraujo ėminio paėmimo. Užšaldyti negalima.
VT601	Trombocitų agregacija visame kraujyje su adenozino difosfatu (ADP)*	2 d.d.	Visas kraujas su heparinu	4 val. +15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	VUL SK	Impedanso agregometrijos	Visas kraujo ėminys (visas vakuuminis mėgintuvėlis) gabenamas/pristatomas standartinėmis sąlygomis 15-25°C temperatūroje. Ėminį pristatyti kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 2val. Nuo kraujo ėminio paėmimo. Užšaldyti negalima.

VT3471	Krešėjimo faktorius IX nustatymas (Santaros klinikos)*	7 d.d.	Citrato plazma, 1 ml	4 val. +15 - (+25) °C 15d. -15 - (-20) °C	-15 - (-25) °C	Ne	VUL SK	Koagulimetrisinis	Po centrifugavimo atskirta į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo vienkartinį mėgintuvėlį kraujo plazma gabenama/pristatoma užšaldyta -20 °C temperatūroje.
VT3491	Krešėjimo faktorius VII nustatymas (Santaros klinikos)*	7 d.d.	Citrato plazma, 1 ml	4 val. +15 - (+25) °C 15d. -15 - (-20) °C	-15 - (-25) °C	Ne	VUL SK	Koagulimetrisinis	Po centrifugavimo atskirta į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo vienkartinį mėgintuvėlį kraujo plazma gabenama/pristatoma užšaldyta -20 °C temperatūroje.
VT3481	Krešėjimo faktorius XII nustatymas (Santaros klinikos)*	7 d.d.	Citrato plazma, 1 ml	4 val. +15 - (+25) °C 15d. -15 - (-20) °C	-15 - (-25) °C	Ne	VUL SK	Koagulimetrisinis	Po centrifugavimo atskirta į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo vienkartinį mėgintuvėlį kraujo plazma gabenama/pristatoma užšaldyta -20 °C temperatūroje.
VT350	Von Wilebrand'o krešėjimo faktorius aktyvumo nustatymas*	20 d.d.	Citrato plazma, 1 ml	15 d. - 15 - (-25) °C	-15 - (-25) °C	Ne	VUL SK	Imunoturbidimetrisinis	Po centrifugavimo atskirta į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo vienkartinį mėgintuvėlį kraujo plazma gabenama/pristatoma užšaldyta -20 °C temperatūroje.
LB482	Antitrombino III nustatymas*	2 d.d.	Citrato plazma, 1 ml	1 mėn. -15 - (-20) °C	-20 °C	Ne	VUL SK	Koagulimetrisinis	Po centrifugavimo atskirta į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo vienkartinį mėgintuvėlį kraujo plazma gabenama/pristatoma užšaldyta. Pastaba: visas kraujo ėminys (visas vakuuminis mėgintuvėlis) gali būti gabenamas/pristatomas standartinėmis sąlygomis, 20 ± 5° C temperatūroje, tais atvejais, kai pristatomas ne vėliau nei per 2 val. nuo kraujo ėminio paėmimo.
LB64	D-Dimerai	2 val.	Citrato plazma, 1 ml	8 val. +15 - (+25) °C 4 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Dalelėmis sustiprintas imunoturbidimetrisinis	Didelė D-fragmentų koncentracija, kuri gali atsirasti lizinės terapijos metu, gali lemti sumažėjusius rezultatus. Labai retais atvejais gamapatijos, ypač IgM tipo (Waldenström makroglobulinemija), gali sąlygoti nepatikimus rezultatus. Retais atvejais (mažiau nei 1 pranešas atvejis iš 100000 tyrimų) kai kurie imunoglobulinai gali sukelti nespecifinę agliutinaciją, nulemiančią klaidingai aukštus rezultatus.
VT341	VIII faktorius (kraujo krešėjimo faktorius, antihemofilinis faktorius, AHF)**	20 d.d.	Citrato plazma, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	-20°C	Ne	Vokietija Cottbus	Koagulimetrisinis	
VT343	II krešėjimo faktorius**	20 d.d.	Citrato plazma, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	-20°C	Ne	Vokietija Cottbus	Koagulimetrisinis	
VT344	V krešėjimo faktorius**	20 d.d.	Citrato plazma, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	-20°C	Ne	Vokietija Cottbus	Koagulimetrisinis	
VT347	IX krešėjimo faktorius**	20 d.d.	Citrato plazma, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	-20°C	Ne	Vokietija Cottbus	Koagulimetrisinis	
VT345	X krešėjimo faktorius**	20 d.d.	Citrato plazma, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	-20°C	Ne	Vokietija Cottbus	Koagulimetrisinis	
VT346	XI krešėjimo faktorius**	20 d.d.	Citrato plazma, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	-20°C	Ne	Vokietija Cottbus	Koagulimetrisinis	
VT349	VII krešėjimo faktorius**	20 d.d.	Citrato plazma, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	-20°C	Ne	Vokietija Cottbus	Koagulimetrisinis	
VT348	XII krešėjimo faktorius**	20 d.d.	Citrato plazma, 1 ml	4 val. +2 - (+8) °C 6 mėn. -20 °C	-20°C	Ne	Vokietija Cottbus	Koagulimetrisinis	
VT342	XIII faktorius (kraujo krešėjimo faktorius , fibriną stabilizuojantis faktorius, Laki-Lorand faktorius)**	20 d.d.	Citrato plazma, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	-20°C	Ne	Vokietija Cottbus	Koagulimetrisinis	
HEMATOLOGINIAI TYRIMAI									
LK01	Automatinis kraujo tyrimas (26 analitės)	1 val.	EDTA kraujas, 3 ml	24 val. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Tėkmės citometrijos metodas (naudojant puslaidininkį lazerį) remiantis hidrodinaminio fokusavimo aptikimu ir SLS-hemoglobino metodu.	
LK013	Automatinis kraujo tyrimas (33 analitės su retikulocitais)	1 val.	EDTA kraujas, 3 ml	24 val. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Srauto citometrijos, hidro dinaminio aptikimo, SLS aptikimo, išvestiniai rodikliai	
LK03	Retikulocitai	1 val.	EDTA kraujas, 3 ml	24 val. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Srauto citometrijos, hidro dinaminio aptikimo, SLS aptikimo, išvestiniai rodikliai	
LK04	Citomorfologinis kraujo ląstelių tyrimas	2 val.	EDTA kraujas, 3 ml	6 val. +15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Taip		Mikroskopinis, dažymas Hemacolor būdu.	Jei pirminis mėginys paimtas/pristatytas į laboratoriją likus mažiau nei 1 val. iki laboratorijos darbo pabaigos, mėginys nepriimamas tirti.

LK02	Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG)	1 val.	EDTA kraujas, 3 ml	24 val. +2 - (+8) °C 4 val.+15- (+25) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Modifikuotas Westergreno.	
LK043	Automatinio tyrimo verifikavimas tepinėlyje (trombocitų skaičius)	2 val.	EDTA kraujas, 3 ml	6 val. +15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Taip		Mikroskopinis, dažymas Hemacolor būdu.	Jei pirminis mėginys paimtas/pristatytas į laboratoriją likus mažiau nei 2 val. iki laboratorijos darbo pabaigos, mėginys nepriimamas tirti.
LB51	Kraujo grupė ir RhD faktorius	2 val.	EDTA plazma, 1 ml	48 val. +2 - (+8) °C ilgiau -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Hemagliutinacija	Tyrimus rekomenduojama atlikti tą pačią dieną. Tyrimui gali būti naudojama serumas surinktas į mėgintuvėlį be gelio. Bakterinis mėginio užteršimas gali sukelti nepriimtinius rezultatus.
LB52	Kumbso mėginys (Antikūnai prieš Rh)	2 val.	EDTA plazma, 1 ml	48 val. +2 - (+8) °C ilgiau -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Hemagliutinacija	Tyrimus rekomenduojama atlikti tą pačią dieną. Tyrimui gali būti naudojama serumas surinktas į mėgintuvėlį be gelio. Bakterinis mėginio užteršimas gali sukelti nepriimtinius rezultatus.
LB522	Kumbso tiesioginė reakcija*	7 d.d.	EDTA kraujas, 3 ml Necentrifuguoti	24 val. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Hemagliutinacija	Pristatyti per 24 val.
LK42	Lėtinio limfoproliferacinio susirgimo fenotipo tyrimas tėkmės citometru*	2 d.d.	EDTA kraujas, 3 ml Necentrifuguoti	24 val. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Tekmės citometrija	Pristatyti per 24 val. Užsakant LK42 tyrimą, BŪTINA papildomai užsakyti ir atlikti šiuos tyrimus: LK013 Automatinis kraujo tyrimas (33 analitės su retikulocitais); LK04 Citomorfologija (leukograma). LK013 ir LK04 tyrimų rezultatų kopijos siunčiamos į VUL SK.
BENDROSIOS CITOLOGIJS TYRIMAI									
LK09	Automatinis šlapimo tyrimas (santykinis tankis, pH,leukocitai, nitritai, baltymas, gliukozė, ketoniniai kūnai, urobilino genas, bilirubinas, eritrocitai)	1 val.	Šlapimas, 5 ml	3 val. +2 - (+8) °C Laikyti tamsoje	+2 - (+8) °C	Taip		Atspindžio fotometrinis	Mėginys po surinkimo turi būti pristatytas į laboratoriją ne vėliau kaip per 1 val. Jei pirminis mėginys paimtas/pristatytas į laboratoriją likus mažiau nei 1 val. iki laboratorijos darbo pabaigos, mėginys nepriimamas tirti.
LK10	Šlapimo mikroskopija	2 val.	Šlapimas, 1 ml	3 val. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Mikroskopinis	Mėginys po surinkimo turi būti pristatytas į laboratoriją ne vėliau kaip per 1 val. Jei pirminis mėginys paimtas/pristatytas į laboratoriją likus mažiau nei 1 val. iki laboratorijos darbo pabaigos, mėginys nepriimamas tirti.
VT371	Šlapimo takų akmenų cheminės sudėties tyrimas**	20 d.d.	Akmenys	+15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Infraraudonųjų spindulių spektroskopija	
VT372	Tulžies pūslelės akmenų cheminės sudėties tyrimas**	20 d.d.	Akmenys	+15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Infraraudonųjų spindulių spektroskopija	
LK15	Šlapimo takų akmenų tyrimas*	3 d.d.	Akmenys	7 d.+15 - (+25) °C	+15 - +25°C	Ne	VUL SK	Cheminis, tirpinimas rūgštimis	
LK11	Koprograma	3 val.	Išmatos	12 val. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Mikroskopinis: a) su fiziologiniu b) su liugoliu c) su metileno tirpalu	Jei pirminis mėginys paimtas/pristatytas į laboratoriją likus mažiau nei 2 val. iki laboratorijos darbo pabaigos, mėginys nepriimamas tirti.
LK121	Kirminių kiaušinėlių ir patologinių pirmuonių nustatymas	3 val.	Išmatos	12 val. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Mini Parasept.SF rinkinys-išmatų nusėdimo koncentravimas. Mikroskopinis.	Jei pirminis mėginys paimtas/pristatytas į laboratoriją likus mažiau nei 2 val. iki laboratorijos darbo pabaigos, mėginys nepriimamas tirti.
LK12	Nuograndų tyrimas spalvinėms nustatyti	3 val.	Nuograndos nuo išangės	12 val. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Mikroskopinis	
TK03	Parazitų, jų kiaušinių ir cistų nustatymas formalino-eterio sedimentacijos metodu*	3 d.d.	Šviežios arba konservuotos 10% formalinu išmatos	1val. +15 - (+25) °C Konservuotos 10% formalinu: 7d. +15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C Ėminys priimamas tik V.Grybo g. 32A, Vilnius	Ne	NVSPL	Natyvinis tepinėlis, formalino-eterio sedimentacijos, mikroskopinis	

LK131	iFOBT testas slaptam kraujavimui nustatyti išmatose	3 val.	Išmatos	3 d. +2 - (+8) °C	6 val. +15 -+25°C ilgiau +2 -+8°C	Taip		Imunochromatografija	• Mėginys nėra renkamas menstruacinio ciklo metu arba iš pacientų, kurie turi kraujuojantį hemorojinį mazgą ar hematuriją. • Alkoholis, aspirinas ir kiti vartojami vaistai gali sukelti gastrointestinalinį sudirginimą, kuris turi įtakos testo rezultatui. Tokios medžiagos turėtų būti nutrauktos mažiausiai 48 val. prieš mėginio surinkimą. • Dietos apribojimai nėra būtini. Geriausių rezultatų galima tikėtis, jei testas bus atliktas per 6 val. nuo išmatų paėmimo. Jeigu to atlikti taip greitai nepavyks, mėginiai gali būti laikomi dar 3d.
LK23	Spermos automatizuotas tyrimas ir spermatozoidų morfologijos nustatymas	3 val.	Sperma (laikyti šiltai)	1 val. +20 - (+37) °C	+20 - (+37) °C Ėminys priimamas tik V.Grybo g. 32A, Vilnius	Taip		Automatinis ir mikroskopinis tyrimas	Atliekamas PIRMADIENIAIS, TREČIADIENIAIS IR PENKTADIENIAIS Jei ėminys pristatytas į laboratoriją likus mažiau nei 2 val. iki laboratorijos darbo pabaigos, ėminys nepriimamas tirti.
LK19	Prostatos sekreto tyrimas	3 val.	Prostatos sekretas	24 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C	Taip		Mikroskopinis, dažymas Löffler metileno mėliu.	Jei pirminis mėginys paimtas/pristatytas į laboratoriją likus mažiau nei 2 val. iki laboratorijos darbo pabaigos, mėginys nepriimamas tirti tuo atveju, jei kita yra ne darbo diena.
LK191	Prostatos sekreto natyvinio preparato mikroskopinis tyrimas	3 val.	Prostatos sekretas	24 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C	Taip			Jei pirminis mėginys paimtas/pristatytas į laboratoriją likus mažiau nei 2 val. iki laboratorijos darbo pabaigos, mėginys nepriimamas tirti tuo atveju, jei kita yra ne darbo diena.
LK313	Makšties išskyrų mikroskopinis tyrimas	24 val.	Tepinėlis	24 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C	Taip		Mikroskopinis, dažymas Löffler metileno mėliu ir Gramo būdu	Jei pirminis mėginys paimtas/pristatytas į laboratoriją likus mažiau nei 2 val. iki laboratorijos darbo pabaigos, mėginys nepriimamas tirti tuo atveju, jei kita yra ne darbo diena.
LK314	Gimdos kaklelio išskyrų mikroskopinis tyrimas	24 val.	Tepinėlis	24 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C	Taip		Mikroskopinis, dažymas Löffler metileno mėliu ir Gramo būdu	Jei pirminis mėginys paimtas/pristatytas į laboratoriją likus mažiau nei 2 val. iki laboratorijos darbo pabaigos, mėginys nepriimamas tirti tuo atveju, jei kita yra ne darbo diena.
LK315	Moters šlaplės išskyrų mikroskopinis tyrimas	24 val.	Tepinėlis	24 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C	Taip		Mikroskopinis, dažymas Löffler metileno mėliu ir Gramo būdu	Jei pirminis mėginys paimtas/pristatytas į laboratoriją likus mažiau nei 2 val. iki laboratorijos darbo pabaigos, mėginys nepriimamas tirti tuo atveju, jei kita yra ne darbo diena.
LK31	Tepinėlis iš uretros	3 val.	Tepinėlis	24 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C	Taip		Mikroskopinis, dažymas Löffler metileno mėliu	Jei pirminis mėginys paimtas/pristatytas į laboratoriją likus mažiau nei 2 val. iki laboratorijos darbo pabaigos, mėginys nepriimamas tirti tuo atveju, jei kita yra ne darbo diena.
LK312	Tepinėlis nuo apyvarpės	3 val.	Tepinėlis	24 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C	Taip		Mikroskopinis, dažymas būdais	Jei pirminis mėginys paimtas/pristatytas į laboratoriją likus mažiau nei 2 val. iki laboratorijos darbo pabaigos, mėginys nepriimamas tirti tuo atveju, jei kita yra ne darbo diena.
LK18	Sąnarinio skysčio tyrimas (VULSK)	1 d.d.	Sąnarinis skystis (mėgintuvėlis su heparinu)	Tirti iš karto	+15 -+25°C Ėminys priimamas tik V.Grybo g. 32A, Vilnius	Ne	VUL SK	Juslinis, apžiūrint, Skaičiavimas Thomas kameroje, Mikroskopinis	Pirminis mėginys privalo būti paimtas ir pristatytas į laboratoriją iki 12 val.
LK181	Sąnarinio skysčio tyrimas	1 d.d.	Sąnarinis skystis (mėgintuvėlis su heparinu)	Tirti iš karto	+15 -+25°C Ėminys priimamas tik V.Grybo g. 32A, Vilnius	Taip		Apžiūrint (įvertinamos fizinės savybės), Ląstelių skaičiavimas Thomas kameroje, Mikroskopinis	Pirminis mėginys nedelsiant pristatomas į laboratoriją. Jei pirminis mėginys paimtas/pristatytas į laboratoriją likus mažiau nei 2 val. iki laboratorijos darbo pabaigos, mėginys nepriimamas tirti.
LK41	Sąnarinio skysčio tyrimas kristalams nustatyti	3 val.	Sąnarinis skystis	Tirti iš karto	+15 -+25°C	Taip		Mikroskopinis	Jei pirminis mėginys paimtas/pristatytas į laboratoriją likus mažiau nei 2 val. iki laboratorijos darbo pabaigos, mėginys nepriimamas tirti.
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI									
TB04	Kraujo pasėlis+antibiograma+identifikavimas*	14 d.d.	Suaugusiems - 2 BACTEC terpės, 20 ml kraujo Vaikams iki 3 m. BACTEC pediatriinė terpė 1 – 3 ml kraujo Grybams speciali terpė, 8-10 ml kraujo	Ne daugiau 24 val. apie +37 °C	+15 -+25°C	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	Pasėlj galima imti bet kuriuo metu, nelaukiant temperatūros pakilimo. Jei jau naudoja antibiotikus, tai pasėlis imamas prieš kitos dozės vartojimą. (Pvz.: jei reikia vaistus gerti ryte (8 val.), tai prieš jų vartojimą). Paėmimas: 1. Nuo terpių buteliukų (BACTEC suaugusiems 2 terpės 20 ml kraujo, vaikams iki 3 m. BACTEC pediatriinė terpė 1 – 3 ml kraujo, grybams speciali terpė 8-10 ml kraujo) nuimti kamštelius, 2 kartus nuvalyti 70° etanolio.2. Odą 5 cm diameteru valyti ° etanolio. Po to koncentriniais judesiais nuo centro periferijos kink valyti tą patį plovą 2% spiritiniu jodo tirpalu.3. Po dezinfekcijos neliesi venos dūrio vietoje.4. Surinkti kraują į vakuuminius buteliukus: 10 ml į aerobinę ir 10 ml į anaerobinę terpę.5. Odą nuvalyti 70° etanolio.

TB05	Išmatų pasėlis+antibiograma+identifikavimas*	7 d.d.	Išmatos (indelis arba spec. transportinė terpė)	Ne daugiau 24 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	Po defekacijos į dezinfekuotą basoną ar kitą indą, parenkama vieta su gleivėmis ar krauju, steriliu plastmasiniu šaukšteliu pridama į išmatoms skirtą transportinę terpę.
TB22	Išmatų pasėlis+antibiotikograma+grybų nustatymas*	7 d.d.	Išmatos (indelis arba spec. transportinė terpė)	Ne daugiau 24 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	Po defekacijos į dezinfekuotą basoną ar kitą indą, parenkama vieta su gleivėmis ar krauju, steriliu plastmasiniu šaukšteliu pridama į išmatoms skirtą transportinę terpę.
TB01	Skreplių pasėlis+tepinėlis+identifikavimas+antibiograma*	7 d.d.	Skrepliai (sterilus indelis)	Ne daugiau 24 val. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	1. Surinkti prižiūrint slaugytojai ar gydytojui. 2. Prieš tai lignonis išsivalo dantis ir išskalauja burną steriliu ar virintu vandeniu.
TB021	Šlapimo pasėlis+antibiograma+identifikavimas*	7 d.d.	Šlapimas (sterilus indelis)	2 val. 18-25°C 24 val. +2 - (+8) °C Urine monovette švirkšte: 48val. 18-25°C	Šlapimas (sterilus indelis): +2 - (+8) °C Urine monovette švirkšte: +15 -+25°C	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	Urine monovette švirkšte gabenamas 18-25°C temperatūroje per 48 val. nuo surinkimo. Ligoniu paaiškinti šias taisykles: 1. Nusiplauna lytinius organus muilu ir vandeniui. 2. Nuvaloma sterilia marle. 3. Surinkti laisvos srovės vidurinę porciją į sterilų indą.
TB022	Pieno pasėlis+antibiograma+identifikavimas*	7 d.d.	Pienas (sterilus indas)	Ne daugiau 24 val. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	
TB23	Skrandžio gleivinės biopato pasėlio Helicobacter pylori identifikavimui ir jautrumo antibakteriniam*	30 d.d.	Gastrofibroskopijos metu paimta skrandžio gleivinės biopsinė medžiaga (minimalus biopato dydis 2 x 2 mm) įdedama į sterilų plastikinį užsukamą indelį, kuriame turi būti įpilta apie 100 µL sterilaus 0,9% NaCl tirpalo (tokiu būdu ėminys apsaugomas nuo išdžiūvimo).	6 val. 18-25°C 24 val. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C Ėminys priimamas tik V.Grybo g. 32A, Vilnius	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	ŠEŠTADIENIAIS ĖMINYS PRIIMAMAS TIK IKI 11val. !!! Ėminys į laboratoriją turi būti pristatomas kaip įmanoma greičiau (pageidautina per 6 val., kai dar galima laikyti ir gabenoti 18-25°C temperatūroje), jei negalima pristatyti per 6 valandas, tada laikyti ir gabenoti būtina 2-8°C temperatūroje (maksimalus laikymo terminas šaldytuve 24 val.)
TB023	Kitų biologinių skysčių pasėlis+antibiograma+identifikavima*	7 d.d.	Biologiniai skysčiai (sterilus indelis)	Ne daugiau 24 val. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	
TB031	Spermos, prostatos sekreto pasėlis+mikroskopija+antibiograma+identifikavimas*	7 d.d.	Prostatos sekretas (spec. transportinė terpė) / Sperma	Ne daugiau 24 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	1. Lytiniai organai nuplaunami muilu ir vandeniui. 2. Masažuojama <i>per rectum</i> . 3. Steriliu tamponu surinkti ėminį ir įdėti į transportinę terpę .
TB032	Uretros sekreto pasėlis+mikroskopija+antibiograma+identifikavimas*	7 d.d.	Uretros sekretas (spec. transportinė terpė)	Ne daugiau 24 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	1. Ploną sterilių tamponą įvesti 2 cm į šlaplę ir atsargiai pasukti 2 s. 2. Tamponą įdėti į transportinę terpę .
TB033	Žaizdų pasėlis+antibiograma+identifikavimas*	7 d.d.	Tepinėlis nuo žaizdos (spec. transportinė terpė)	Ne daugiau 24 val.+15 - (+25) °C. Ne daugiau 8 val. +2 - (+8) °C	+15 -+25°C	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	1. Gerai apvalyti odą apie žaizdą 70° etanoliumi. 2. Pašalinti nuo žaizdos paviršiaus pūlius, apnašas, nekrotines mases. 3. Po to steriliu tamponu braukti nuo centro į periferiją. 4. Tamponą įdėti į transportinę terpę. 5. Geriau – paimti bioplatą arba aspiratą į sterilų indą.
TB0331	Pūlių sekreto pasėlis+antibiograma+identifikavimas*	7 d.d.	Pūliai (spec. transportinė terpė)	Ne daugiau 24 val.+15 - (+25) °C. Ne daugiau 8 val. +2 - (+8) °C	+15 -+25°C	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	
TB034	Gerklės išskyry sekreto pasėlis+mikroskopija+antibiograma+identifikavimas*	10 d.d	Tepinėlis iš gerklės (spec. transportinė terpė)	Ne daugiau 24 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	1. Mentele prispausti liežuvelį. 2. Steriliu tamponu imti nuo tonzilių, ryklės uždegiminių vietų. 3. Tamponą įdėti į transportinę terpę
TB0351	Nosies landos sekreto pasėlis + antibiograma + identifikavimas*	10 d.d.	Tepinėlis iš nosies (spec. transportinė terpė)	Ne daugiau 24 val. +15 - (+25) °C Meningokokams neleidžiama laikyti	+15 -+25°C	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	1. Švelniau judesiu lankstų tamponą įvesti perį nosį į nosiaryklę. 2. Atsargiai sukti tamponą apie 5 s., kad absorbuotų sekretą. 3. Tamponą įdėti į transportinę terpę . 4. <u>Meningokokų</u> nešiojimui patartina sėti į maitinamąsias terpes prie lignonio lovos.
TB035	Nosiaryklės išskyry sekreto pasėlis+mikroskopija+antibiograma+identifikavimas*	10 d.d.	Tepinėlis iš nosiaryklės (spec. transportinė terpė)	Ne daugiau 24 val. +15 - (+25) °C Meningokokams neleidžiama laikyti	+15 -+25°C	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	1. Švelniau judesiu lankstų tamponą įvesti perį nosį į nosiaryklę. 2. Atsargiai sukti tamponą apie 5 s., kad absorbuotų sekretą. 3. Tamponą įdėti į transportinę terpę . 4. <u>Meningokokų</u> nešiojimui patartina sėti į maitinamąsias terpes prie lignonio lovos.
TB036	Tepinėlio iš ausų pasėlis+mikroskopija+antibiograma+identifikavimas.*	10 d.d.	Tepinėlis iš ausų (spec. transportinė terpė)	Ne daugiau 24 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	1. Sudrėkinti sterilių tamponą steriliu distiliuotu vandeniu ar fiziologiniu tirpalu. Pašalinti apnašus iš ausies kanalo. Tamponą išmesti. 2. Sterilių tamponą sudrėkinti fiziologiniu tirpalu, stiprius judesius paimti tiriamąją medžiagą į transportinę sistemą.

TB037	Tepinėlio iš akių pasėlis+mikroskopija+antibiograma+identifikavimas*	10 d.d.	Tepinėlis iš akių (spec. transportinė terpė)	Ne daugiau 24 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	1. Ėminius būtina paimti iš abiejų akių, atskirais steriliais tamponais, suvilgytais steriliu fiziologiniu tirpalu, tamponus įdėti į transportinę terpę
TB038	Gimdos kaklelio išskyrų tepinėlio pasėlis+mikroskopija+antibiograma+identifikavimas*	7 d.d.	Tepinėlis iš gimdos kaklelio (spec. transportinė terpė)	Ne daugiau 24 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	1. Steriliu tamponu pašalinti nuo gimdos kaklelio sekretą, gleives. 2. Tamponą išmesti. 3. Sterilių tamponą įvesti į gimdos kanalą 2 cm ir atsargiai sukuti 10 s. 4. Tamponą įdėti į transportinę terpę .
TB13	Streptokokų išskyrimas*	7 d.d.	Sterilus indas arba spec. transportinė terpė	Ne daugiau 24 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	
TB19	Pasėlis dėl grybelio*	14 d.d.	Sterilus indas arba spec. transportinė terpė	Ne daugiau 24 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	
TB24	Atrankinis pasėlis iš išangės ėminio dėl atsparių bakterijų nešiojimo (imamas gyd. kab.)*	10 d.d.	Spec. transportinė terpė	Ne daugiau 24 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	Epidemiologinės stebėsenos tyrimai dėl atsparių bakterijų nešiojimo
TB25	Atrankinis pasėlis nuo kirkšnių odos dėl atsparių bakterijų nešiojimo	10 d.d.	Spec. transportinė terpė	Ne daugiau 24 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	Epidemiologinės stebėsenos tyrimai dėl atsparių bakterijų nešiojimo
TB26	Atrankinis pasėlis nuo pažastų odos dėl atsparių bakterijų nešiojimo	10 d.d.	Spec. transportinė terpė	Ne daugiau 24 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	Epidemiologinės stebėsenos tyrimai dėl atsparių bakterijų nešiojimo
TB27	Pasėlis iš nosies/nosiaryklės dėl meticilinui rezistentiško Staphylococcus aureus (MRSA)	10 d.d.	Spec. transportinė terpė	Ne daugiau 24 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	Epidemiologinės stebėsenos tyrimai dėl atsparių bakterijų nešiojimo
TB28	Pasėlis iš įvairių ėminių dėl meticilinui rezistentiško Staphylococcus aureus (MRSA)	10 d.d.	Spec. transportinė terpė	Ne daugiau 24 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	Epidemiologinės stebėsenos tyrimai dėl atsparių bakterijų nešiojimo
TB29	Pasėlis iš kvėpavimo takų dėl multirezistentiškų bakterijų	10 d.d.	Spec. transportinė terpė	Ne daugiau 24 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	Epidemiologinės stebėsenos tyrimai dėl atsparių bakterijų nešiojimo
TB30	Pasėlis iš įvairių ėminių dėl multirezistentiškų bakterijų	10 d.d.	Spec. transportinė terpė	Ne daugiau 24 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	Epidemiologinės stebėsenos tyrimai dėl atsparių bakterijų nešiojimo
LK26	Mikroskopinis tyrimas dėl grybelio plaukuose	2 val.	Plaukai	1 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C Ėminys priimamas tik V.Grybo g. 32A, Vilnius	taip		Mikroskopinis	Jei ėminys pristatytas į laboratoriją likus mažiau nei 1 val. iki laboratorijos darbo pabaigos, mėginys nepriimamas tirti.
LK27	Mikroskopinis tyrimas dėl grybelio odoje	2 val.	Odos pleiskanos	1 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C Ėminys priimamas tik V.Grybo g. 32A, Vilnius	Taip		Mikroskopinis	Jei ėminys pristatytas į laboratoriją likus mažiau nei 1 val. iki laboratorijos darbo pabaigos, mėginys nepriimamas tirti.
LK28	Mikroskopinis tyrimas dėl grybelio naguose (vieno nago)	24 val.	Nagai	24 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C	Taip		Mikroskopinis	Jei ėminys pristatytas į laboratoriją likus mažiau nei 2 val. iki laboratorijos darbo pabaigos, mėginys nepriimamas tirti tuo atveju, jei kita yra ne darbo diena.
LK36	Demodex folliculorum nustatymas	30 min	Oda, blakstienos	Tirti iš karto	+15 -+25°C Ėminys priimamas tik V.Grybo g. 32A, Vilnius	Taip		Mikroskopinis	Jei ėminys pristatytas į laboratoriją likus mažiau nei 30 min. iki laboratorijos darbo pabaigos, mėginys nepriimamas tirti.
INFEKcinės serologijos tyrimai (įskaitant molekulinius, virusų ir kt. infekcinių žymenų tyrimus)									
Hepatitų nukleorūgščių nustatymo tyrimai									
LF292	Hepatito B viruso DNR tyrimas viruso replikacijai nustatyti*	20 d.d.	Serumas, 2 ml Privaloma imti į spec. mėgintuvėlį su skiriamuoju geliu!!!	24 val. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	NVSPL	Molekulinis	
LF307	Hepatito C RNR nustatymas kiekybiniu metodu*	20 d.d.	Spec. mėgintuvėlis	48 val. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	NVSPL	Molekulinis	
Lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo tyrimai									
TL08	Chlamydia trachomatis (PGR)	3 d.d.	Speciali transportinė terpė (ėminiai iš gimdos kaklelio gali būti imami į skystą terpę „ThinPrep“ arba „SurePath“)	iki 1 mėn. +15 - (+25) °C arba +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		PGR	Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas

TL081	Chlamydia trachomatis (PGR) šlapime	3 d.d.	"Pirminės porcijos" rytinis šlapimas, surinktas į sterilų indelį. Tyrimui reikia 10 - 50 ml šlapimo.	Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2 - (+8) °C 1 d.d. laikotarpyje	+2 - (+8) °C	Taip		PGR	Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas
TL14	Neisseria gonorrheae (PGR)	3 d.d.	Speciali transportinė terpė (Ėminiai iš gimdos kaklelio gali būti imami į skystą terpę „ThinPrep“ arba „SurePath“)	iki 1 mėn. +15 - (+25) °C arba +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		PGR	Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas
TL142	Neisseria gonorrheae (PGR) šlapime	3 d.d.	"Pirminės porcijos" rytinis šlapimas, surinktas į sterilų indelį. Tyrimui reikia 10 - 50 ml šlapimo.	Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2 - (+8) °C 1 d.d. laikotarpyje	+2 - (+8) °C	Taip		PGR	Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas
TL23	Mycoplasma hominis (PGR)	3 d.d.	Speciali transportinė terpė (Ėminiai iš gimdos kaklelio gali būti imami į skystą terpę „ThinPrep“ arba „SurePath“)	iki 1 mėn. +15 - (+25) °C arba +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		PGR	Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas
TL231	Mycoplasma hominis (PGR) šlapime	3 d.d.	"Pirminės porcijos" rytinis šlapimas, surinktas į sterilų indelį. Tyrimui reikia 10 - 50 ml šlapimo.	Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2 - (+8) °C 1 d.d. laikotarpyje	+2 - (+8) °C	Taip		PGR	Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas
TL24	Mycoplasma genitalium (PGR)	3 d.d.	Speciali transportinė terpė (Ėminiai iš gimdos kaklelio gali būti imami į skystą terpę „ThinPrep“ arba „SurePath“)	iki 1 mėn. +15 - (+25) °C arba +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		PGR	Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas
TL241	Mycoplasma genitalium (PGR) šlapime	3 d.d.	"Pirminės porcijos" rytinis šlapimas, surinktas į sterilų indelį. Tyrimui reikia 10 - 50 ml šlapimo.	Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2 - (+8) °C 1 d.d. laikotarpyje	+2 - (+8) °C	Taip		PGR	Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas
TL25	Ureaplasma spp. (PGR)	3 d.d.	Speciali transportinė terpė (Ėminiai iš gimdos kaklelio gali būti imami į skystą terpę „ThinPrep“ arba „SurePath“)	iki 1 mėn. +15 - (+25) °C arba +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		PGR	Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas
TL251	Ureaplasma spp. DNR šlapime (PGR)	3 d.d.	"Pirminės porcijos" rytinis šlapimas, surinktas į sterilų indelį. Tyrimui reikia 10 - 50 ml šlapimo.	Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2 - (+8) °C 1 d.d. laikotarpyje	+2 - (+8) °C	Taip		PGR	Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas
TL26	Gardnerella vaginalis (PGR)	3 d.d.	Speciali transportinė terpė (Ėminiai iš gimdos kaklelio gali būti imami į skystą terpę „ThinPrep“ arba „SurePath“)	iki 1 mėn. +15 - (+25) °C arba +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		PGR	Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas
TL27	Trichomonas vaginalis (PGR)	3 d.d.	Speciali transportinė terpė (Ėminiai iš gimdos kaklelio gali būti imami į skystą terpę „ThinPrep“ arba „SurePath“)	iki 1 mėn. +15 - (+25) °C arba +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		PGR	Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas
TL271	Trichomonas vaginalis (PGR) šlapime	3 d.d.	"Pirminės porcijos" rytinis šlapimas, surinktas į sterilų indelį. Tyrimui reikia 10 - 50 ml šlapimo.	Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2 - (+8) °C 1 d.d. laikotarpyje	+2 - (+8) °C	Taip		PGR	Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas
TL28	Candida albicans (PGR)	3 d.d.	Speciali transportinė terpė (Ėminiai iš gimdos kaklelio gali būti imami į skystą terpę „ThinPrep“ arba „SurePath“)	iki 1 mėn. +15 - (+25) °C arba +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		PGR	Tyrimas iš šlapimo neatliekamas! Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas
TL33	Herpes Simplex virusas (SV1/2) PGR	3 d.d.	Speciali transportinė terpė (Ėminiai iš gimdos kaklelio gali būti imami į skystą terpę „ThinPrep“ arba „SurePath“)	iki 1 mėn. +15 - (+25) °C arba +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		PGR	Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas
TL452	7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis) nustatymas (PGR)	3 d.d.	Speciali transportinė terpė (Ėminiai iš gimdos kaklelio gali būti imami į skystą terpę „ThinPrep“ arba „SurePath“)	iki 1 mėn. +15 - (+25) °C arba +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		PGR	Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas

TL453	7-į lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhea, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis) nustatymas šlapime (PGR)	3 d.d.	" Pirminės porcijos " rytinis šlapimas, surinktas į sterilų indelį. Tyrimui reikia 10 - 50 ml šlapimo.	Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2 - (+8) °C 1 d.d. laikotarpyje	+2 - (+8) °C	Taip		PGR	Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas
TL456	Mikoplazmų nustatymas (U. parvum, U. urealyticum, M. genitalium, M. hominis)	3 d.d.	Speciali transportinė terpė (ėminiai iš gimdos kaklelio gali būti imami į skystą terpę „ThinPrep“ arba „SurePath“)	iki 1 mėn. +15 - (+25) °C arba +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		PGR	Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas
TL457	Mikoplazmų nustatymas (U. parvum, U. urealyticum, M. genitalium, M. hominis) šlapime	3 d.d.	" Pirminės porcijos " rytinis šlapimas, surinktas į sterilų indelį. Tyrimui reikia 10 - 50 ml šlapimo.	Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2 - (+8) °C 1 d.d. laikotarpyje	+2 - (+8) °C	Taip		PGR	Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas
TL461	3 lytiškai plint.ligų sukėlėjai PGR (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp.)	3 d.d.	Speciali transportinė terpė (ėminiai iš gimdos kaklelio gali būti imami į skystą terpę „ThinPrep“ arba „SurePath“)	iki 1 mėn. +15 - (+25) °C arba +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		PGR	Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas
TL4581	12 lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjų nustatymas PGR (N. gonorrhoeae, Ch. trachomatis, M. genitalium, M. hominis, Trich. vaginalis, U. urealyticum, U. parvum, Herpes simplex 1, Herpes simplex 2, T. pallidum, Candida albicans, G. vaginalis)	3 d.d.	Speciali transportinė terpė (ėminiai iš gimdos kaklelio gali būti imami į skystą terpę „ThinPrep“)	iki 1 mėn. +15 - (+25) °C arba +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		PGR	Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas
TL4582	12 lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjų nustatymas šlapime (N. gonorrhoeae, Ch. trachomatis, M. genitalium, M. hominis, Trich. vaginalis, U. urealyticum, U. parvum, Herpes simplex 1, Herpes simplex 2, T. pallidum, Candida albicans, G. vaginalis)	3 d.d.	" Pirminės porcijos " rytinis šlapimas, surinktas į sterilų indelį. Tyrimui reikia 10 - 50 ml šlapimo.	Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2 - (+8) °C 1 d.d. laikotarpyje	+2 - (+8) °C	Taip		PGR	Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas
TL462	3-jų lytiškai plintančių sukėlėjų (C. trachomatis, Ureaplasma, M. genitalium) nustatymas šlapime	3 d.d.	" Pirminės porcijos " rytinis šlapimas, surinktas į sterilų indelį. Tyrimui reikia 10 - 50 ml šlapimo.	Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2 - (+8) °C 1 d.d. laikotarpyje	+2 - (+8) °C	Taip		PGR	Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas
TL44	Mycoplasma hominis ir Ureaplasma spp. nustatymas bei jautrumo antibiotikams tyrimas	3 d.d.	Mėginio paėmimui skirta speciali transportinė terpė, kurioje nuplaunamos ląstelės iš gimdos kaklelio, šlaplės	72 val. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Kultūros auginimas Šlapalo - Arginino bujlone	

Žemos ir aukštos rizikos ŽPV tipų nukleorūgščių nustatymo tyrimai

TL315	Aukštos rizikos ŽPV genotipų nustatymas (AR ŽPV genotipavimas).	7 d.d.	Speciali transportinė terpė	iki 1 mėn. +15 - (+25) °C arba +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		PGR	Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas. Tyrimo rezultate matomas konkretus ŽPV genotipas (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68).
TL316	Atrankinis aukštos rizikos ŽPV genotipų nustatymas (16,18 ŽPV + AR)	7 d.d.	Speciali transportinė terpė	iki 1 mėn. +15 - (+25) °C arba +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		PGR	Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas. Tyrimas pateikia ar identifiikuotas 16, 18 genotipas ir bendrai AR (nepateikiamas tikslus genotipas)
TL3151	Atrankinis aukštos rizikos ŽPV genotipų nustatymas (TLK) (TLK 16,18 ŽPV + AR)	7 d.d.	Speciali transportinė terpė	iki 1 mėn. +15 - (+25) °C arba +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		PGR	Išgryninta DNR saugoma nuo -20°C iki -80°C temperatūroje ne trumpiau nei 7 dienas. Užsakomas tik pagal programą.

Kitų virusų, bakterijų ir pirmuonių nukleorūgščių nustatymo tyrimai

TV041	CMV (citomegalo viruso) DNR kiekybinis nustatymas tikralaikės PGR metodu*	4 d.d.	Išmatos	24 val. +2 - (+8) °C	Išmatos pristatomas darbo dienomis per 24 val. nuo surinkimo laikant +2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Tikralaikė PGR	
APSK45	Tymų ir raudonukės virusų nustatymas PGR NVSPL (papildomai užsakyti APSK46)*	5 d.d.	Nazofaringinis ir orofaringinis tepinėlis	+2 - (+8) °C	+4 - (+8) °C	Ne	NVSPL (Žolyno g. 36 arba Gėlių g. 9)	PGR	Pristatyti per 72 val. Vienam pacientui 2 tamponėliai dedami į vieną terpę. Tamponėliai negali išdžiūti. Mėgintuvėliai su ėminiais laikomi vertikaliai.
TV051	Raudonukės viruso RNR nustatymas PGR metodu*	5 d.d.	Nazofaringinis ir orofaringinis tepinėlis	+2 - (+8) °C	+4 - (+8) °C	Ne	NVSPL (Žolyno g. 36 arba Gėlių g. 9)	PGR	Pristatyti per 72 val. Vienam pacientui 2 tamponėliai dedami į vieną terpę. Tamponėliai negali išdžiūti. Mėgintuvėliai su ėminiais laikomi vertikaliai.
TV281	Tymų viruso RNR nustatymas PGR metodu*	5 d.d.	Nazofaringinis ir orofaringinis tepinėlis	+2 - (+8) °C	+4 - (+8) °C	Ne	NVSPL (Žolyno g. 36 arba Gėlių g. 9)	PGR	Pristatyti per 72 val. Vienam pacientui 2 tamponėliai dedami į vieną terpę. Tamponėliai negali išdžiūti. Mėgintuvėliai su ėminiais laikomi vertikaliai.
VT173	Parvovirusas B19 DNR**	20 d.d.	EDTA kraujas, 1 ml	+2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	PGR	

LG05	Kvėpavimo takų virusinių ir bakterinių infekcijų sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo panelis	2 val.	Speciali molekuliniams tyrimams transportinė terpė	48 val. +15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Taip		PGR	Tyrimas atliekamas darbo dienomis nuo 8:00 iki 18:00; šeštadieniais – nuo 8:00 iki 13:00. Vieno tyrimo metu nustatomi sukėlėjai: Adenovirusas; Koronavirusas 229E/ HKU1 / NL63 / OC43; MERS-CoV; SARS-CoV-2; Žmogaus metapneumovirusas; Žmogaus rinovirusas/ enterovirusas; Gripo A virusas (H1 / H3 / H1-2009); Gripo B virusas; Paragripo virusas 1 / 2 / 3 / 4; RSV; <i>Bordetella parapertussis</i> ; <i>Bordetella pertussis</i> ; <i>Chlamydia pneumoniae</i> ; <i>Mycoplasma pneumoniae</i> .
LG051	Žarnyno infekcijų bakterinių, virusinių ir parazitinių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo panelis	2 val.	Išmatos surinktos į sterilių indelių. Ėminio kiekis: 0,2 ml. Pristatomas per 2 val. nuo paėmimo!	+2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C Ėminys priimamas tik V.Grybo g. 32A, Vilnius	Taip		PGR	Tyrimas atliekamas darbo dienomis nuo 8:00 iki 18:00; šeštadieniais – nuo 8:00 iki 13:00. Vieno tyrimo metu nustatomi sukėlėjai: BAKTERIJOS: Campylobacter (C. jejuni / C. coli / C. upsaliensis); Clostridioides difficile; Plesiomonas shigelloides; Salmonella; Vibrio (V. parahaemolyticus/ V. vulnificus/ V. cholerae); Yersinia enterocolitica; Enterogregacinės E. coli (EAEC); Enteropatogeninė E. coli (EPEC); Enterotoksigeninė E. coli (ETEC); Į Shiga panašų toksiną gaminanti E. coli (STEC), įskaitant E. coli O157; Shigella / enteroinvazinė E. coli (EIEC). PIRMUONYS: Cryptosporidium; Cyclospora cayetanensis; Entamoeba histolytica; Giardia lamblia. VIRUSAI: Adenovirusas F 40/41; Astrovirusas; Norovirusas GI/GII; A rotavirusas; Sapovirusas (I, II, IV ir V genogrups).
LG06	Helicobacter pylori ir atsparumo klaritromicinui nustatymas PGR metodu	7 d.d.	Išmatos surinktos į sterilių indelių arba specialią transportinę terpę	48 val. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		PGR	
TL204	Candida PGR paletė (C.albicans, C.tropicalis, C.dubliniensis, C.parapsilosis, C.glabrata, C.krusei, C.lusitaniae)*	7 d.d.	Odos nuograndos, plaukai su folikulu, nagai – patalpinti į sausą Eppendorf mėgintuvėlį	7 d. +2 - (+8) °C 14 d. -15 - (-20) °C	+15 - (+25) °C	Ne	Medicina Practica	PGR	
TL205	Dermatofitų PGR paletė (T. rubrum complex, Microsporum spp., E. floccosum, T. mentagrophytes complex, T. tonsurans)*	7 d.d.	Odos nuograndos, plaukai su folikulu, nagai – patalpinti į sausą Eppendorf mėgintuvėlį	24 val. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-20) °C	+15 - (+25) °C	Ne	Medicina Practica	PGR	
TL206	Dermatofitų ir Candida PGR paletė*	7 d.d.	Odos nuograndos, plaukai su folikulu, nagai – patalpinti į sausą Eppendorf mėgintuvėlį	24 val. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-20) °C	+15 - (+25) °C	Ne	Medicina Practica	PGR	
Tyrimai dėl Tuberkuliozės									
TM05	Pasėlis dėl TBC rankiniu būdu*	45 d.d.	Skrepliai (sterilus indelis)	72 val. +2 - (+8) °C	+15 -+25°C	Ne	VUL SK	Mikrobiologinis	1. Surinkti prižiūrint slaugytojai ar gydytojai. 2. Prieš tai ligonis išsivalo dantis ir išskalauja burną steriliu ar virintu vandeniu. 3. Skrepliai į sterilių indelių .
VT21	Quanti FERON TB Gold*	7 d.d.	4 Specialūs mėgintuvėliai (violetinis, pilkas, geltonas, žalias)	16val. +15 - (+25) °C iki inkubacijos. 72val. +2 - (+8) °C po inkubacijos. Spec. paruošimas. Jeigu mėginys paimamas penktadienį iki 11 val., į VUL SK nesiunčiamas, inkubuojamas MDC.	+15 - (+25) °C iki inkubacijos. +2 - (+8) °C po inkubacijos.	Ne	VUL SK	ELISA	Paimti mėgintuvėliai, jei nebuvo išvežti iš karto, tai ne vėliau kaip po 16 val. inkubuojami +37°C temperatūroje 16 - 24 val. Po inkubacijos centrifuguojami 3000 aps 15 min. Po centrifugavimo mėginiai saugomi ir transportuojami +2 - (+8) °C. Iki inkubacijos transportuojami +15 - (+25) °C temperatūroje. Po inkubacijos +2 - (+8) °C Penktadienį mėginiai priimami į LDC tik iki 11 valandos!!!
Retrovirusų diagnostikos tyrimai									
LF66	Žmogaus imunodeficito viruso ŽIV1 p24 antigeno ir ŽIV 1/2 antikūnų nustatymas	2 val.	Serumas, 1 ml	7 d. +20 - (+25) °C 1 mėn. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti 5 kartus)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA / PGR	Teigiami rezultatai patvirtinimui siunčiami į NVSPL referentinę ŽIV laboratoriją. Gavę neigiamą tyrimo rezultatą negalime visiškai atmesti ŽIV infekcijos galimybės. Neigiami rezultatai retkarčiais gali būti gauti serumo ir plazmos mėginiuose, paimtuose labai ankstyvoje (preserokonversijos) fazėje arba vėlyvoje ŽIV infekcijos fazėje. Dėl dar nežinomų ŽIV variantų taip pat gali būti gauti neigiami ŽIV rezultatai. ŽIV antigenų ar antikūnų prieš ŽIV buvimas nėra AIDS diagnozė. Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
LF661	Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) Ag ir antikūnų nustatymo sertifikato išdavimas	2 val.	-	-	-	Taip		-	

TV021	ŽIV antikūnų patvirtinimas imunoblotingu (WB, LIA)*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	4 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	NVSPL	WB	
Erkių ir uodų pernešamų ligų serologiniai tyrimai									
TP24	Erkinio encefalito IgM	7 d.d.	Serumas, 1 ml	14 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15- (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ELISA	Atliekamas PIRMADIENIAIS / KETVIRTADIENIAIS Nepilnai sukrešėjęs serumas ir mikrobiologiškai užteršti ėminiai neturi būti tiriami. Fibrino siūlai, eritrocitai turi būti pašalinti iš mėginių Pridavus ėminius tyrimo atlikimo dieną iki 09:30 val., tyrimai bus atlikti tą pačią dieną. Vėliau priduoti ėminiai bus atliekami kitą, pagal planą numatytą, tyrimo atlikimo dieną (pvz., pridavus ėminį I po 09:30 val., tyrimas bus atliktas IV).
TP241	Erkinio encefalito IgG	7 d.d.	Serumas, 1 ml	14 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15- (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ELISA	Atliekamas PIRMADIENIAIS / KETVIRTADIENIAIS Nepilnai sukrešėjęs serumas ir mikrobiologiškai užteršti ėminiai neturi būti tiriami. Fibrino siūlai, eritrocitai turi būti pašalinti iš mėginių. Pridavus ėminius tyrimo atlikimo dieną iki 09:30 val., tyrimai bus atlikti tą pačią dieną. Vėliau priduoti ėminiai bus atliekami kitą, pagal planą numatytą, tyrimo atlikimo dieną (pvz., pridavus ėminį I po 09:30 val., tyrimas bus atliktas IV).
TP244	Erkinio encefalito IgG (povakcininiam vertinimui)	7 d.d.	Serumas, 1 ml	14 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15- (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ELISA	Atliekamas PIRMADIENIAIS / KETVIRTADIENIAIS Nepilnai sukrešėjęs serumas ir mikrobiologiškai užteršti ėminiai neturi būti tiriami. Fibrino siūlai, eritrocitai turi būti pašalinti iš mėginių. Pridavus ėminius tyrimo atlikimo dieną iki 09:30 val., tyrimai bus atlikti tą pačią dieną. Vėliau priduoti ėminiai bus atliekami kitą, pagal planą numatytą, tyrimo atlikimo dieną (pvz., pridavus ėminį I po 09:30 val., tyrimas bus atliktas IV).
TP25	Laimo boreliozės IgM	7 d.d.	Serumas, 1 ml	7 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15- (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ELISA	Atliekamas PIRMADIENIAIS / KETVIRTADIENIAIS Nepilnai sukrešėjęs serumas ir mikrobiologiškai užteršti ėminiai neturi būti tiriami. Fibrino siūlai, eritrocitai turi būti pašalinti iš mėginių. Pridavus ėminius tyrimo atlikimo dieną iki 09:30 val., tyrimai bus atlikti tą pačią dieną. Vėliau priduoti ėminiai bus atliekami kitą, pagal planą numatytą, tyrimo atlikimo dieną (pvz., pridavus ėminį I po 09:30 val., tyrimas bus atliktas IV).
TP251	Laimo boreliozės IgG	7 d.d.	Serumas, 1 ml	7 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15- (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ELISA	Atliekamas PIRMADIENIAIS / KETVIRTADIENIAIS Nepilnai sukrešėjęs serumas ir mikrobiologiškai užteršti ėminiai neturi būti tiriami. Fibrino siūlai, eritrocitai turi būti pašalinti iš mėginių. Pridavus ėminius tyrimo atlikimo dieną iki 09:30 val., tyrimai bus atlikti tą pačią dieną. Vėliau priduoti ėminiai bus atliekami kitą, pagal planą numatytą, tyrimo atlikimo dieną (pvz., pridavus ėminį I po 09:30 val., tyrimas bus atliktas IV).
TK11	Laimo ligos sukėlėjo IgM nustatymas imunoblotingu (WB)	14 d.d.	Serumas, 1 ml	14 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Westernblotas	Tyrimas atliekamas kas antrą trečiadienį.
TK111	Laimo ligos sukėlėjo IgG nustatymas imunoblotingu (WB)*	14 d.d.	Serumas, 1 ml	14 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Westernblotas	Tyrimas atliekamas kas antrą trečiadienį.
VT523	Antikūnai IgG prieš maliarijos sukėlėją**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	48 val. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofluorescentinis	
Oro lašelių infekcijų serologiniai tyrimai									
TV28	Tymų virusas IgG	1 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ELISA	ŠEŠTADIENIAIS TYRIMAS NEATLIEKAMAS
TV29	Tymų virusas IgM*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	NVSPL	ELISA	
VT17	Epideminio parotito antikūnai IgG**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
VT171	Epideminio parotito antikūnai IgM**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
TV342	EBV (Epštein Baro viruso) IgG	2 d.d.	Serumas, 1 ml	4 d. +2 - (+8) °C 58 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ELISA	ŠEŠTADIENIAIS TYRIMAS NEATLIEKAMAS Ėminio su hemolize tyrimo rezultatai turėtų būti vertinami atsargiai.

TV343	EBV (Epštein Baro viruso) IgM	2 d.d.	Serumas, 1 ml	4 d. +2 - (+8) °C 12 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ELISA	ŠEŠTADIENIAIS TYRIMAS NEATLIEKAMAS Ėminio su hemolize tyrimo rezultatai turėtų būti vertinami atsargiai.
TV38	Varicella zoster viruso IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	2 d.d.	Serumas, 1 ml	4 d. +2 - (+8) °C 58 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		CLIA	
TV381	Varicella zoster viruso IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	NVSPL	Chemoluminescentinis	
VT2003	Varicella zoster viruso IgA antikūnų nustatymas**	20 d.d.	Serumas. 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	(-20)°C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
TV442	Anti-SARS CoV-2 antikūnių nustatymas	2 val.	Serumas, 1 ml	14 d. +15 - (+25) °C 14 d. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti 3 kartus)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	
TV39	Kokliušo IgG nustatymas*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	NVSPL	Imunofermentinis	
TV391	Kokliušo IgA nustatymas*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	NVSPL	Imunofermentinis	
VT73	IgG prieš parakokliušo sukėlėją**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
VT522	Antikūnai IgG prieš Clamidia psittaci**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	48 val. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofluorescentinis	
VT805	Antikūnai prieš difterijos toksiną **	20 d.d.	Serumas, 1 ml	7 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
APSK46	Tymų ir raudonukės virusų nustatymas ELISA NVSPL (papildomai užsakyti APSK45)*	5 d.d.	Serumas, 3 ml	+2 - (+8) °C	+4 - (+8) °C	Ne	NVSPL (Žolyno g. 36 arba Gėlių g. 9)	ELISA	Pristatyti per 72 val. Mėginiai centrifuguojami, neatpilami. Bendras ėminio tūris - ne mažiau 3 ml.
VT1731	Parvo viruso B19 IgM antikūnų nustatymas**	20 d.d.	Serumas. 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	(-20)°C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofermentinis	
VT1732	Parvo viruso B19 IgG antikūnų nustatymas**	20 d.d.	Serumas. 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	(-20)°C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofermentinis	
TP38	IgG antikūnų prieš Brucella spp. nustatymas kraujo serume**	20 d.d.	Serumas. 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	(-20)°C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
TP381	IgM antikūnų prieš Brucella spp. nustatymas kraujo serume**	20 d.d.	Serumas. 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	(-20)°C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
VT2004	Brucella spp. DNR **	20 d.d.	EDTA kraujas 3 ml	+15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	Vokietija Cottbus	PGR	
Bakterinių infekcijų serologiniai tyrimai									
TP311	Kačių jdrėskimo IgG (Bartonella Hensellae) IgG AK nustatymas**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	(-20)°C	Ne	Vokietija Cottbus	IFR	
TP312	Kačių jdrėskimo IgM (Bartonella Hensellae) IgM AK nustatymas**	20 d.d	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	(-20)°C	Ne	Vokietija Cottbus	IFR	
TP27	Mycoplasma pneumoniae IgM	7 d.d.	Serumas, 1 ml	14 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ELISA	Atliekamas ANTRADIENIAIS, PENKTADIENIAIS Bakterinis užterštumas ar pakartotinai atitirpintui ėminiai gali nulemti neteisingą rezultatą. Pridavus ėminius tyrimo atlikimo dieną iki 09:30 val., tyrimai bus atlikti tą pačią dieną. Vėliau priduoti ėminiai bus atliekami kitą, pagal planą numatytą, tyrimo atlikimo dieną (pvz., pridavus ėminį II po 09:30 val., tyrimas bus atliktas V).
TP271	Mycoplasma pneumoniae IgG	7 d.d.	Serumas, 1 ml	14 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ELISA	Atliekamas ANTRADIENIAIS, PENKTADIENIAIS Bakterinis užterštumas ar pakartotinai atitirpintui ėminiai gali nulemti neteisingą rezultatą. Pridavus ėminius tyrimo atlikimo dieną iki 09:30 val., tyrimai bus atlikti tą pačią dieną. Vėliau priduoti ėminiai bus atliekami kitą, pagal planą numatytą, tyrimo atlikimo dieną (pvz., pridavus ėminį II po 09:30 val., tyrimas bus atliktas V).
TP281	Chlamydia pneumoniae IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	2 d.d.	Serumas, 1 ml	4 d. +2 - (+8) °C 50 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ELISA	ŠEŠTADIENIAIS TYRIMAS NEATLIEKAMAS Ėminio su hemolize tyrimo rezultatai turėtų būti vertinami atsargiai.

TP282	Chlamydia pneumoniae IgM nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu	1 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ELISA	ŠEŠTADIENIAIS TYRIMAS NEATLIEKAMAS Ėminio su hemolize tyrimo rezultatai turėtų būti vertinami atsargiai.
TP284	Chlamydia pneumoniae IgA nustatymas imunofermentiniu metodu	1 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ELISA	ŠEŠTADIENIAIS TYRIMAS NEATLIEKAMAS Ėminio su hemolize tyrimo rezultatai turėtų būti vertinami atsargiai.
TP303	Yersinia spp. IgA nustatymas	1 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ELISA	ŠEŠTADIENIAIS TYRIMAS NEATLIEKAMAS Rekomenduojama, kad stipriai hemolizuoti ar lipemiški mėginiai būtų vengiami
TP304	Yersinia spp. IgG nustatymas*	6 d.d.	Serumas, 1 ml	8 val. +15 - (+25) °C 72 val. +2 - (+8) °C 2 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Imunofermentinė	
TB09	Išmatų tyrimas Clostridium difficile toksinui nustatyti	1 d.d.	Šviežios išmatos	24 val. +15 - (+25)°C Ilgiau -15 - (-20) °C	+15 -+25°C jei pristatoma tą pačią dieną. Jeigu kitą dieną – išmatos užšaldomos, pristatomos -20 °C	Taip		Imunochromatografinis	
TP293	Helicobacter pylori IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu (kiekybinis)	2 d.d.	Serumas, 1 ml	4 d. +2 - (+8) °C 44 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ELISA	ŠEŠTADIENIAIS TYRIMAS NEATLIEKAMAS Ėminio su hemolize tyrimo rezultatai turėtų būti vertinami atsargiai.
TP29	Helicobacter pylori IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu (kiekybinis)	2 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ELISA	ŠEŠTADIENIAIS TYRIMAS NEATLIEKAMAS Ėminio su hemolize tyrimo rezultatai turėtų būti vertinami atsargiai.
LF521	Helicobacter pylori antigeno tyrimas išmatose	3 val.	Išmatos, 5 mg	48 val. +2 - (+8) °C 1 metai -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Imunochromatografija	
LK40	Streptokoko A greitisas testas	3 val.	Tepinėlis iš nosiaryklės	Tirti iš karto	+15 -+25°C	Taip		Imunochromatografinis	
LB094	Anti-deoksiribonukleazės B antikūnai (anti-DNRazės B)**	20 d.d.	Serumas, 2 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	(-20)°C	Ne	Vokietija Cottbus	Nefelometrinis	
VT525	IgG antikūnai prieš Streptococcus pneumoniae**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	48 val. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
VT72	Antikūnai IgG prieš Chlamydia trachomatis	20 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15- (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip	Vokietija Cottbus	ELISA	
VT721	Antikūnai IgM prieš Chlamydia trachomatis	1 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15- (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ELISA	ŠEŠTADIENIAIS TYRIMAS NEATLIEKAMAS
VT71	Antikūnai IgA prieš Chlamydia trachomatis**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	48 val. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
VT803	Antikūnai IgG prieš stabligės toksiną **	20 d.d.	Serumas, 2 ml	7 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
VT806	Antikūnai prieš pasiutligę (tinka vertinti tik vakcinacijos efekto kontrolei prieš arba po ekspozicijos)**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	7 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus		
Grybinių infekcijų serologiniai tyrimai									
TB20	Aspergillus antigeno (Galaktomananas)*	14 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15- (-25) °C	-20°C	Ne	VUL SK	Chemiluminescentinė imunoanalizė	Po centrifugavimo atskirtas į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo vienkartinį mėgintuvėlį kraujo serumas gabenamas/pristatomas šaltai, 2-8 ° C temperatūroje. Pastaba: jei kraujo ėminys yra paimtas į vakuuminį mėgintuvėlį su gelio barjeru gali būti pristatytas visas nucentrifuguotas mėgintuvėlis.
TB21	Candida antigeno (Mananas)*	15 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15- (-25) °C	-20°C	Ne	VUL SK	Chemiluminescentinė imunoanalizė	
VT44	Antikūnai IgG prieš Candida albicans**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	3 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -20 °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
VT45	Antikūnai IgM prieš Candida albicans**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	3 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -20 °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
VT76	Antikūnai prieš Aspergillus fumigatus**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
VT761	Aspergillus fumigatus Antigenas**	20 d.d.	Serumas, 1 ml Gali būti bronchoalveolinis lavažas (BAL) bei bronchialinis sekretas	Serumas: - 1 mėn. -15- (-25) °C Kiti mėginiai: +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	

Lytiniu keliu plintančių infekcijų serologiniai tyrimai									
TL021	Sifilio RPR	2 val.	Serumas, 1 ml.	7 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Pasyvi agliutinacija	
TL0222	Antikūnai prieš Treponema pallidum	2 val.	Serumas, 1 ml.	3 d. +2 - (+8) °C ilgiau -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		Tiesioginis anti-treponeminių antikūnų	Hemolizinis serumas netinka tirti.
TL023	TPHA kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu*	7 d.d.	Serumas, 1 ml.	7 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	NVSPL	Hemagliutinacija	
TL18	Sifilio IgM antikūnų patvirtinimas imunoblotingu (WB, LIA)*	14 d.d.	Serumas, 1 ml.	7 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK		
TL19	Sifilio IgG antikūnų patvirtinimas imunoblotingu (WB, LIA)*	14 d.d.	Serumas, 1 ml.	7 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Imunoblotas	

Parazitinių ligų serologiniai tyrimai									
TK05	Echinococcus granulosus IgG antikūnai*	14 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	NVSPL	ELISA	
TK051	IgG klasės antikūnai prieš Echinococcus multilocularis*	14 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	NVSPL	ELISA	
TK052	IgG antikūnai prieš Echinococcus spp.**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
TK06	IgG klasės antikūnai prieš Trichinella spiralis (T spiralis IgG)*	14 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	NVSPL	ELISA	
TK07	Cisticerkozės IgG antikūnai (Anti-cysticercosis IgG)*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	NVSPL	ELISA	
TK08	Serologinis tyrimas echinokokų IgG nustatymui imunoblotingu (WB)*	14 d.d.	Serumas, 1 ml	14 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	NVSPL	Westernblotas	
TK13	Liamblijų (Giardia lamblia) Ag nustatymas*	7 d.d.	Išmatos	Šviežios išmatos, pristatomos nedelsiant	+15 - (+25) °C Ėminys priimamas tik V.Grybo g. 32A, Vilnius	Ne	NVSPL	Imunofermentinis, imunochromotografinis	
TK14	Amebiasės serologinis tyrimas*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	NVSPL	ELISA	
TP23	Toxocara canis IgG	10 d.d.	Serumas, plazma su citratu, negalima šaldyti pakartotinai, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ELISA	Bakterinis užterštumas ar pakartotinai atitirpinti ėminiai gali nulemti neteisingą rezultatą.

TORCH infekcijų grupės serologiniai tyrimai (Nėštumo patologijas sukeliančios infekcijos)

TP26	Toxoplasma gondii IgM	2 val.	Serumas, 1 ml	3 d. +20 - (+25) °C 3 sav. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti 5 kartus)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Pacientų, sergančių ŽIV, pacientų, kuriems taikomas imunosupresinis gydymas, ar pacientų, turinčių kitų sveikatos sutrikimų, lemiančių imunosupresiją, tyrimų rezultatai turi būti interpretuojami atsargiai. Padidėjusi nespecifinių IgM koncentracija gali lemti teigiamų mėginių reikšmės suradimo sumažėjimą, atliekant Elecsys Toxo IgM tyrimą. Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
TP261	Toxoplasma gondii IgG	2 val.	Serumas, 1 ml	3 d. +20 - (+25) °C 21 d. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti 6 kartus)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Pacientų, sergančių ŽIV, pacientų, kuriems taikomas imunosupresinis gydymas, ar pacientų, turinčių kitų sveikatos sutrikimų, lemiančių imunosupresiją, tyrimų rezultatai turi būti interpretuojami atsargiai. Padidėjusi nespecifinių IgM koncentracija gali lemti teigiamų mėginių reikšmės suradimo sumažėjimą, atliekant Elecsys Toxo IgM tyrimą. Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
TP264	Toxoplasma gondii IgG avidiškumas*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	CLIA	

TV03	CMV (citomegalo viruso) IgG tyrimas imunofermentiniu metodu	2 val.	Serumas, 1 ml	7 d. +20 - (+25) °C 28 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti 5 kartus)	+15 - (+25) °C arba +2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Pacientų, sergančių ŽIV, pacientų, kuriems taikomas imunosupresinis gydymas, ar pacientų, turinčių kitų sveikatos sutrikimų, lemiančių imunosupresiją, tyrimų rezultatai turi būti interpretuojami atsargiai. Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
TV031	CMV (citomegalo viruso) IgG avidiškumo nustatymas*	2 d.d.	Serumas, 1 ml		+2 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Imunoblotas	
TV04	CMV (citomegalo viruso) IgM tyrimas imunofermentiniu metodu	2 val.	Serumas, 1 ml	7 d. +20 - (+25) °C 1 mėn. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti 5 kartus)	+15 - (+25) °C arba +2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Pacientų, sergančių ŽIV, pacientų, kuriems taikomas imunosupresinis gydymas, ar pacientų, turinčių kitų sveikatos sutrikimų, lemiančių imunosupresiją, tyrimų rezultatai turi būti interpretuojami atsargiai. Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
TV05	Rubella IgG tyrimas	2 val.	Serumas, 1 ml	7 d. +20 - (+25) °C 1 mėn. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti 5 kartus)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Pacientų, sergančių ŽIV, pacientų, kuriems taikomas imunosupresinis gydymas, ar pacientų, turinčių kitų sveikatos sutrikimų, įtakančių imunosupresiją, tyrimų rezultatai turi būti interpretuojami atsargiai
TV06	Rubella IgM tyrimas*	4 d.d	Serumas, 1 ml	3 d. +15 - (+25) °C 21 d. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-20) °C (galima užšaldyti 6 kartus)	+2 - (+8) °C	Ne	NVSPL	IFA/MCIA	Pacientų, sergančių ŽIV, pacientų, kuriems taikomas imunosupresinis gydymas, ar pacientų, turinčių kitų sveikatos sutrikimų, įtakančių imunosupresiją, tyrimų rezultatai turi būti interpretuojami atsargiai
TV121	Herpes SV1 IgM tyrimas	1 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ELISA	ŠEŠTADIENIAIS TYRIMAS NEATLIEKAMAS Heterofiliniai antikūnai žmogaus serume gali reaguoti su imunoglobulinais, esančiais reagentų sudėtyje. Ėminiai iš ligonių, nuolat esančių kontakte su gyvūnais ar jų serumo produktais, gali pakeisti tyrimo rezultatus
TV36	Herpes SV1 ir SV2 IgM (bendro abiems tipams) nustatymas	2 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ELISA	ŠEŠTADIENIAIS TYRIMAS NEATLIEKAMAS Heterofiliniai antikūnai žmogaus serume gali reaguoti su imunoglobulinais, esančiais reagentų sudėtyje. Ėminiai iš ligonių, nuolat esančių kontakte su gyvūnais ar jų serumo produktais, gali pakeisti tyrimo rezultatus
TV37	Herpes SV1 ir SV2 IgG (bendro abiems tipams) nustatymas	1 d.d.	Serumas, 1 ml	4 d. +2 - (+8) °C 16 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ELISA	ŠEŠTADIENIAIS TYRIMAS NEATLIEKAMAS Padidinta koncentracija Herpes Sv1/SV2 IgG gali būti pas ligonius su varicela zoster, Epstein-Baro ar citomegalo virusų infekcijomis dėl jų antigeninio kryžminio reagavimo su herpes virusų šeimos atstovais. Heterofiliniai antikūnai žmogaus serume gali reaguoti su imunoglobulinais, esančiais reagentų sudėtyje. Ėminiai iš ligonių, nuolat esančių kontakte su gyvūnais ar jų serumo produktais, gali pakeisti tyrimo rezultatus.
TV371	Herpes SV1 IgG nustatymas	1 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ELISA	ŠEŠTADIENIAIS TYRIMAS NEATLIEKAMAS
TV372	Herpes SV2 IgG nustatymas	2 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Taip		ELISA	ŠEŠTADIENIAIS TYRIMAS NEATLIEKAMAS
VT58	IgM AK prieš Herpes 6 tipo virusą**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofluorescentinis	
VT581	IgG antikūnai prieš Herpes 6 tipo virusą**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	1 mėn. -15- (-25) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Imunofluorescentinis	
Virusinių hepatitų serologiniai tyrimai									
LF23	Hepatito A viruso antikūnai (Anti-HAV) *	2 d.d.	Serumas, 1 ml	6 d. +20 - (+25) °C 14 d. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-20) °C (galima užšaldyti 5 kartus)	+2 - (+8) °C	Ne	NVSPL	ECLIA	Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
LF24	Hepatito A viruso antikūnai IgM (Anti-HAV IgM)*	4 d.d.	Serumas, 1 ml	7 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-20) °C (galima užšaldyti 5 kartus)	+2 - (+8) °C	Ne	NVSPL	ECLIA	Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.

LF25	Hepatito B paviršinis antigenas (HBs Ag)	2 val.	Serumas, 1 ml	7 d. +20 - (+25) °C 14 d. +2 - (+8) °C 6 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti 6 kartus)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Remiantis dabartinėmis žiniomis galima teigti, kad naudojantis turimais HBsAg nustatymo tyrimais negalima identifikuoti visų infekuotų kraujo mėginių ar asmenų. Gavę neigiamą tyrimo rezultatą negalime būti tikri ir atmesti kontakto su hepatito B virusine infekcija galimybės. Neigiami tyrimo rezultatai, gauti tiriant asmenis, kurie buvo užsikrėtę praicityje, galėjo atsirasti dėl to, kad antigeno koncentracija buvo mažesnė už šio tyrimo nustatymo ribą arba dėl to, kad buvo per silpna antigenų ir šiame tyrime naudojamų antikūnų reakcija. Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
LF26	Hepatito B paviršinio antigeno antikūnai (Anti-HBs)	2 val.	Serumas, 1 ml	7 d. +20 - (+25) °C 14 d. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti 5 kartus)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	
LF27	Hepatito B šerdinio (core) antigeno antikūnai(Anti HBc)	2 val.	Serumas, 1 ml	7 d. +20 - (+25) °C 14 d. +2 - (+8) °C 3 mėn. -15 - (-25) °C (galima užšaldyti 5 kartus)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
LF28	Hepatito B šerdinio (core) antigeno antikūnai IgM(Anti-HBc IgM)*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 3 mėn.-15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	NVSPL	Imunofermentinis	
LF29	Hepatito B e antigeno antikūnai (Anti-HBe)*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 3 mėn.-15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	NVSPL	Imunofermentinis	
LF291	Hepatito B e antigenas (HBcAg)*	7 d.d.	Serumas, 1 ml	5 d. +2 - (+8) °C 3 mėn.-15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	NVSPL	Imunofermentinis	
LF30	Hepatito C viruso antikūnai (Anti-HCV)	2 val.	Serumas, 1 ml	7 d. +20 - (+25) °C 14 d. +2 - (+8) °C 3 mėn. 15 - (-25) °C (galima užšaldyti 6 kartus)	+2 - (+8) °C	Taip		ECLIA	Ankstyvose infekcijos stadijose dėl ilgo laiko tarpo nuo užsikrėtimo iki serokonversijos, gali būti gauti neigiami anti-HCV tyrimo rezultatai. Jei įtariama ūmi hepatito C infekcija, HCV infekcijos buvimą galima įrodyti HCV RNR matavimais, atliekant atvirkštinės transkriptazės polimerazinę grandininę reakciją. Antikūnių nustatymas neleidžia diferencijuoti ūmios, lėtinės ar atsinaujinusios infekcijos. Vartojant biotiną, > 5mg/d., tirti ne anksčiau kaip po 8 val.
LF53	Hepatito D viruso bendrų antikūnų nustatymas (Anti-HDV) **	20 d.d.	Serumas, 1 ml	ilgiau -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	EIA	
VT301	Hepatito D viruso RNR nustatymas kraujyje**	20 d.d.	5 ml EDTA kraujas	+2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	Polimerazės grandininė reakcija (PGR)	
LF531	Antikūnai IgM prieš hepatito E virusą**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	ilgiau -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
LF533	Antikūnai IgG prieš hepatito E virusą**	20 d.d.	Serumas, 1 ml	ilgiau -15 - (-20) °C	+2 - (+8) °C	Ne	Vokietija Cottbus	ELISA	
Virusų antigenų tyrimai									
LK39	Noro viruso nustatymas išmatose*	1 d.d.	Išmatos	3 val. +15 - (+25) °C 24 val. -15 - (-20) °C	+15 -+25°C	Ne	NVSPL	Imunochromatografinis	Pristatyti į laboratoriją per 24 val. nuo paėmimo. Būtina šaldyti.
LK37	Roto ir Adeno virusų nustatymas išmatose	1 val.	Išmatos	2 val. +15 - (+25) °C	+15 -+25°C	Taip		Imunochromatografinis	Jei ėminys pristatytas į laboratoriją likus mažiau nei 1 val. iki laboratorijos darbo pabaigos, ėminys neprimamas tirti.
TV451	Kombinuotas 4-ių kvėpavimo takų virusų antigenų testas (SARS-CoV-2, Gripas A/B, RSV, Adenovirusas)	2 val.	Tepinėlis iš nosiaryklės	Tirti iš karto	+15 -+25°C	Taip		Imunochromatografinis	
TV45	SARS-CoV-2 antigeno nustatymas	2 val.	Tepinėlis iš nosiaryklės	Tirti iš karto	+15 -+25°C	Taip		Imunochromatografinis	
GENETINIAI TYRIMAI									
LG01	Dažniausiai HFE geno mutacijų, lemiančių I tipo hemochromatozę, tyrimas*	14 d.d.	EDTA kraujas, 3 ml	24 val. +2 - (+8) °C	+2 - (+8) °C Pristatyti per 1 d.d.	Ne	VUL SK		
LG07	Apolipoproteino E (APOE) genotipavimas**	20 d. d.	EDTA kraujas, 3 ml	+15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	Vokietija Cottbus		PRIVALOMAS PASIRAŠYTAS INFORMUOTO PACIENTO SUTIKIMAS NR 26.

GT12	BRCA dažniausių mutacijų nustatymas*	20 d.d.	EDTA kraujas, 2 ml	24 val. +4 - (+8) °C	+4 - (+8) °C	Ne	NVI	Kiekybinis PGR	Tyrimai skiriami tik gydytojo genetiko!
GT21	VERACITY NIPT dėl 21,18,13 chromosomų trisomijų su vaisiaus lyties nust.*	12 d.d.	specialus paėmimo rinkinys, kurį sudaro pakuotė, 2 mėgintuvėliai, 6ml	+15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	Genotipas	PGR	Tyrimai gali būti imami TIK pirmadieniais-ketvirtadieniais Tyrimas užsakomas tik per gydytojus ginekologus. Tyrimai atliekami nuo 10 -os nėštumo savaitės. Tyrimo atsakymai pateikiami gydančiam gydytojui per 7-9 d.d.
GT22	VERACITY NIPT dėl 21,18,13 chromosomų trisomijų, lytinių X, Y chromosomų aneupl*	12 d.d.	specialus paėmimo rinkinys, kurį sudaro pakuotė, 2 mėgintuvėliai, 6 ml	+15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	Genotipas	PGR	Tyrimai gali būti imami TIK pirmadieniais-ketvirtadieniais Tyrimas užsakomas tik per gydytojus ginekologus. Tyrimai atliekami nuo 10 -os nėštumo savaitės. Tyrimo atsakymai pateikiami gydančiam gydytojui per 7-9 d.d.
GT23	VERACITY NIPT dėl 21,18,13 chromosomų trisomijų, lytinių X, Y chromosomų aneupl*	12 d.d	specialus paėmimo rinkinys, kurį sudaro pakuotė, 2 mėgintuvėliai, 6 ml	+15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	Genotipas	PGR	Tyrimai gali būti imami TIK pirmadieniais-ketvirtadieniais Tyrimas užsakomas tik per gydytojus ginekologus. Tyrimai atliekami nuo 10 -os nėštumo savaitės. Tyrimo atsakymai pateikiami gydančiam gydytojui per 7-9 d.d.
GT24	VERAgeneT dėl 21,18,13 chromosomų trisomijų, lytinių X, Y chromosomų aneupl*	12 d.d	specialus paėmimo rinkinys, kurį sudaro pakuotė, 2 mėgintuvėliai, 6 ml ir tėvo seilių surinkimo mėgintuvėlis	+15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	Genotipas	PGR	Tyrimai gali būti imami TIK pirmadieniais-ketvirtadieniais Tyrimas užsakomas tik per gydytojus ginekologus. Tyrimai atliekami nuo 10 -os nėštumo savaitės. Tyrimo atsakymai pateikiami gydančiam gydytojui per 7-9 d.d. Žando tepinėlių reikia paimti nedelsiant po pakuotės atidarymo. Įimdami paciento mėginį, tamponėlio per stipriai nespauskite ir nelenkite, nes gali lūžti tamponėlio strypas. Suėmę tamponėlį už uodegytės, įkiškite jį į burną ir sudrėkinkite jį seilėmis palaikykite 10 sekundžių ant liežuvio. Nustumkite tamponėlį į kurią nors burnos pusę (į viršų ar į apačią) ir 10 sekundžių stipriai patrinkite tarp žando ir dantenų. Kita ranka švelniai paspauskite tą skruostą, kad trintis dar padidėtų. Mėginį duodantis pacientas 30 minučių iki mėginio paėmimo negali rūkyti, valgyti, gerti (išskyrus vandenį), valytis dantų ar kramtyti kramtomąją gumą.
GT191	Neinvazinis prostatos vėžio tyrimas su PCA3, TMPRSS2:ERG biožymenimis*	7 d.d.	Šlapimas (pirmoji šlapimo porcija) arba Šlapimas po prostatos masažo (pirmoji šlapimo porcija)	+15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	Diagnolita	Molekulinis	Būtina išankstinė registracija
GT31	Kokybinis JAK2 geno V617F sekos varianto nustatymas*	5 d.d.	Kraujas arba kaulų čiulpai. Mėgintuvėlis su EDTA (violetinis), 5 ml.	72h; +15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	VUL SK	Realaus laiko polimerazės grandinė reakcija (RL-PGR)	Tyrimai gali būti imami TIK pirmadieniais-ketvirtadieniais. Pirminė talpykla su pirminiu mėginiu turi būti įdėta į antrinę talpyklą su minkštinančia ir skysčius absorbuojančia medžiaga, ir transportuojama pakuotėje pažymėtoje specialiu ženkle, žyminiu B kategorijos biologines medžiagos, kambario temperatūroje, vengiant tiesioginių saulės spindulių poveikio.
GT32	Faktoriaus V (F5) geno Leideno sekos varianto (R506Q) nustatymas*	5 d.d.	Kraujas arba kaulų čiulpai. Mėgintuvėlis su EDTA (violetinis), 5 ml.	72h; +15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	VUL SK	Realaus laiko polimerazės grandinė reakcija (RL-PGR)	Tyrimai gali būti imami TIK pirmadieniais-ketvirtadieniais. Pirminė talpykla su pirminiu mėginiu turi būti įdėta į antrinę talpyklą su minkštinančia ir skysčius absorbuojančia medžiaga, ir transportuojama pakuotėje pažymėtoje specialiu ženkle, žyminiu B kategorijos biologines medžiagos, kambario temperatūroje, vengiant tiesioginių saulės spindulių poveikio.
GT33	Protrombino F2 geno sekos varianto G20210A nustatymas*	5 d.d.	Kraujas arba kaulų čiulpai. Mėgintuvėlis su EDTA (violetinis), 5 ml.	72h; +15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	VUL SK	Realaus laiko polimerazės grandinė reakcija (RL-PGR)	Tyrimai gali būti imami TIK pirmadieniais-ketvirtadieniais. Pirminė talpykla su pirminiu mėginiu turi būti įdėta į antrinę talpyklą su minkštinančia ir skysčius absorbuojančia medžiaga, ir transportuojama pakuotėje pažymėtoje specialiu ženkle, žyminiu B kategorijos biologines medžiagos, kambario temperatūroje, vengiant tiesioginių saulės spindulių poveikio.
LG03	M. tuberculosis komplekso ir jo atsparumo rifampicinui nustatymas GeneXpert sistemoje*	2 d.d.	Skrepliai (sterilus indelis) 3-5 ml.	24 val. +4 - (+8) °C	+4 - (+8) °C	Ne	VUL SK	Molekulinis-genetinis	1. Surinkti prižiūrint slaugytojai ar gydytojui. 2. Prieš tai ligonis išsivalo dantis ir išskalauja burną steriliu ar virintu vandeniu. 3. Skrepliai į sterilų indelį. Rytinis ėminys, pristatomas iki 12 val.
GT341	Placenta Safe 3 (Trisomijos 21, 18 ir 13; vaisiaus lytis)* NIPT	5 d.d.	Veninis kraujas (1 STRECK)	+15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	Placenta, Italija		Surinkti slaugytojai ar gydytojui. Tinka vienvaisiam ir dvivaisiam nėštumui . Galima atlikti nuo 10 nėštumo savaitės .
GT34	Placenta Safe™ Rh (Vaisiaus Rh faktorius)*	15 d.d.	Veninis kraujas (1 STRECK)	+15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	Placenta, Italija		Surinkti prižiūrint slaugytojai ar gydytojui. Tinka vaisiaus rezus faktorius. Vienvaisis ir dvivaisis monochorioninis
GT35	Placenta Safe™ 5 (21, 18, 13 trisomijos; X, Y aneuploidijos; vaisiaus lytis)* NIPT	5 d.d.	Veninis kraujas (1 STRECK)	+15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	Placenta, Italija		Surinkti slaugytojai ar gydytojui. Tinka vienvaisiam ir dvivaisiam nėštumui . Galima atlikti nuo 10 nėštumo savaitės .

GT36	Placenta Safe™ Karyo Plus (Visų chromosomų aneuploidijos; >7Mb delecijos ir duplikacijos; 9 mikromodel* NIPT	8 d.d.	Veninis kraujas (1 STRECK)	+15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	Placenta, Italija		Surinkti slaugytojai ar gydytojai. Tinka vienvaisiam ir dvivaisiam nėštumui . Galima atlikti nuo 10 nėštumo savaitės .
GT37	Placenta Safe™ Gene Complete (Monogeninės dominantiniu ir recesyviniu būdu paveldimos ligos)* NIPT	20 d.d.	Nėščiosios veninis kraujas (2 STRECK), partnerio vidinio skruosto mėginys	+15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	Placenta, Italija		Surinkti slaugytojai ar gydytojai. Tinka vienvaisiam ir dvivaisiam nėštumui . Galima atlikti nuo 10 nėštumo savaitės .
GT38	Placenta Safe™ Complete Plus (Visų chromosomų aneuploidijos; delecijos ir duplikacijos >7Mb* NIPT	20 d.d.	Nėščiosios veninis kraujas (2 STRECK), partnerio vidinio skruosto mėginys	+15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	Placenta, Italija		Surinkti slaugytojai ar gydytojai. Tinka vienvaisiam ir dvivaisiam nėštumui . Galima atlikti nuo 10 nėštumo savaitės .
GT39	Placenta Safe™ Full Risk (Visų chromosomų aneuploidijos; >7Mb delecijos ir duplikacijos; 9 mikromodel* NIPT	25 d.d.	Nėščiosios veninis kraujas (2 STRECK), partnerio vidinio skruosto mėginys	+15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	Placenta, Italija		Surinkti slaugytojai ar gydytojai. Tinka vienvaisiam ir dvivaisiam nėštumui . Galima atlikti nuo 10 nėštumo savaitės .
GT40	Paternitysafe® (Prenatalinis tėvystės nustatymas)*	10 d.d.	Nėščiosios veninis kraujas (2 STRECK) ir 2 tėvo vidinio skruosto epitelio mėginiai	+15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	Placenta, Italija		Rezultatai: atitikimas arba neatitikimas. Galimas atlikimas : Nuo 9 nėštumo sav.
GT41	Kiekvieno papildomo įtariamo tėvo DNR analizės *	10 d.d.	2 tėvo vidinio skruosto epitelio mėginiai	+15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	Placenta, Italija		Rezultatai: atitikimas arba neatitikimas. Galimas atlikimas : Nuo 9 nėštumo sav.
GT42	Trombofilijos rizikos įvertinimas*	10 d.d.	Veninis kraujas (1 EDTA)	+15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	Placenta, Italija		Tyrimas rekomenduojamas planuojant nėštumą, nėštumo metu ar prieš vartojant hormoninę kontracepciją.
GT43	GeneScreen Focus (30 genetinių ligų nešiotojo statusas)*	25 d.d.	Veninis kraujas (1 EDTA)	+15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	Placenta, Italija		Siekiant įvertinti riziką perduoti paveldimas ligas palikuonims. Rezultatai leidžia genetikos gydytojai įvertinti riziką ir suteikti rekomendacijas.
GT44	GeneScreen® Complete (2000 genetinių ligų nešiotojo statusas)*	25 d.d.	Veninis kraujas (1 EDTA)	+15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	Placenta, Italija		Rekomenduojama abiem partneriams planuojant nėštumą ar jo metu, siekiant įvertinti paveldimų ligų riziką ir gauti genetiko rekomendacijas.
GT45	AnteCancerW (Vėžio rizikos tyrimas moterims (krūties vėžio + odos vėžio + kolorektalinio vėžio rizika)*	6 savaitės	Burnos epitelio mėginys	+15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	Placenta		Rezultatai su medicininėmis rekomendacijomis pateikiami per 3–6 savaites, atliekant testą iš burnos tepinėlio. Skirta moterims 35–75 metų.
GT46	AnteCancerM (Vėžio rizikos tyrimas vyrams (prostatos vėžio rizikos įvertinimas + odos vėžio rizikos)*	6 savaitės	Burnos epitelio mėginys	+15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	Placenta		Rezultatai su medicininėmis rekomendacijomis pateikiami per 3–6 savaites, atliekant testą iš burnos tepinėlio. Skirta vyrams 40–70 metų,
GT48	Placenta Safe Plus (Trisomijos 21, 18 ir 13; aneuploidijos X, Y; trisomijos 9 ir 16; 6 mikrolelecijos; vaisiaus lytis)	20 d.d.	Kraujas	+15 - (+25) °C	+15 - (+25) °C	Ne	Placenta		Dvivaisio dichorioninio nėštumo atveju: Mikrolelecijos ir lytinių chromosomų aneuploidijos nėra nustatomos.
CITOLOGINIAI TYRIMAI									
LC01	Citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlio tyrimas: dažymas pagal Papanicolaou, įvertinimas pagal Bethesda sistemą, atliekamas gydytojo	4 d.d.	Citologinis tepinėlis ant objektinio stiklelio.	1-40°C temperatūroje, rekomenduojamas kuo mažesnis poveikis temperatūros svyravimais, saulės spinduliais ir kt.	Gabenama specialiaame objektnių stiklelių dėkle	Taip		Mikroskopija, dažymas pagal Papanicolaou	Objektinio stiklelio šlifutoje dalyje užrašomas paciento/-ės vardas, pavardė, gimimo data
LC012	Skystų terpių citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlio tyrimas, atliekamas gydytojo	4 d.d.	Gamyklinis skystos terpės konteineris su mėginiu.	1-40°C temperatūroje, rekomenduojamas kuo mažesnis poveikis temperatūros svyravimais, saulės spinduliais ir kt.	Indai su skystiais gabenami užspaudžiamame ar užklijuojamame plastikiniame maišelyje	Taip		Mikroskopija, dažymas pagal Papanicolaou	Etiketėje atspariu cheminiams reagentams rašikliu užrašoma ar atspausdinama paciento/-ės vardas, pavardė, gimimo data
LC02	Citopatologinis makšties, skreplių, nosies, ausų, liežuvio tepinėlių tyrimas, atliekamas gydytojo	4 d.d.	Citologinis tepinėlis ant objektinio stiklelio.	1-40°C temperatūroje, rekomenduojamas kuo mažesnis poveikis temperatūros svyravimais, saulės spinduliais ir kt.	Gabenama specialiaame objektnių stiklelių dėkle	Taip		Mikroskopija, Giemsa dažymas	Objektinio stiklelio šlifutoje dalyje užrašomas paciento/-ės vardas, pavardė, gimimo data
LC03	Citopatologinis bet kokios lokalizacijos medžiagos tepinėlių (biologinių skysčių, nuoplovų, nuogramų), išskyrus makšties ir gimdos kaklelio tepinėlius, tyrimas, atliekamas gydytojo	4 d.d.	Konteineris su citologiniam tyrimui skirtu biologiniu skysčiu.	1-40°C temperatūroje, rekomenduojamas kuo mažesnis poveikis temperatūros svyravimais, saulės spinduliais ir kt.	Indai su skystiais gabenami užspaudžiamame ar užklijuojamame plastikiniame maišelyje	Taip		Mikroskopija, Giemsa dažymas	Etiketėje atspariu cheminiams reagentams rašikliu užrašoma ar atspausdinama paciento/-ės vardas, pavardė, gimimo data

LC04	Citopatologinis plonos adatos aspiracijos tyrimas, atliekamas gydytojo	4 d.d.	Konteineris su citologiniam tyrimui skirtu biologiniu skysčiu.	1-40°C temperatūroje, rekomenduojamas kuo mažesnis poveikis temperatūros svyravimais, saulės spinduliais ir kt.	Indai su skystiais gabenami užspaudžiamame ar užklijuojamame plastikiniame maišelyje	Taip		Mikroskopija, Giemsa dažymas	Etiketėje atspariu cheminiams reagentams rašikliu užrašoma ar atspausdinama paciento/-ės vardas, pavardė, gimimo data
LC06	Citopatologinis išplėstinis bet kokios lokalizacijos medžiagos tepinėlių tyrimas (daugiau nei 5 preparatų ir/arba papildomi dažymo būdai), atliekamas gydytojo	4 d.d.	Konteineris su citologiniam tyrimui skirtu biologiniu skysčiu.	1-40°C temperatūroje, rekomenduojamas kuo mažesnis poveikis temperatūros svyravimais, saulės spinduliais ir kt.	Gabenama specialiaame objektinių stiklelių dėkle	Taip		Mikroskopija, Giemsa dažymas	Objektinio stiklelio šlifutoje dalyje užrašomas paciento/-ės vardas, pavardė, gimimo data
PATOLOGIJOS TYRIMAI									
LP01	Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno tyrimo objekto) makroskopinis tyrimas - I lygis	6 d.d.	Transportavimo indas su tiriamu objektu, užpiltu 10% neutraliu buferiniu formalino tirpalu santykiu 1:10.	1-40°C temperatūroje, rekomenduojamas kuo mažesnis poveikis temperatūros svyravimais, saulės spinduliais ir kt.	Transportuojama sandariame ir tinkamai pažymėtame konteineryje.	Taip			Stambiai operacinei medžiagai gali būti naudojamas mažesnis nei nurodytas formalino kiekis, tačiau būtina, kad tirpalas pilnai apsemtų tiriamąją medžiagą ir ji tyrimui būtų pristatoma kuo greičiau. Siunčiant tyrimui kelis to paties paciento mėginius, naudojamos atskiros vidinės pakuotės. Medžiaga detaliai aprašoma formoje Nr. 014-1-1/a.
LP02	Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno tyrimo objekto) makroskopinis ir histologinis tyrimas - II lygis	6 d.d.	Transportavimo indas su tiriamu objektu, užpiltu 10% neutraliu buferiniu formalino tirpalu santykiu 1:10.	1-40°C temperatūroje, rekomenduojamas kuo mažesnis poveikis temperatūros svyravimais, saulės spinduliais ir kt.	Transportuojama sandariame ir tinkamai pažymėtame konteineryje.	Taip		Mikroskopija	
LP03	Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno tyrimo objekto) makroskopinis ir histologinis tyrimas - III lygis	6 d.d.	Transportavimo indas su tiriamu objektu, užpiltu 10% neutraliu buferiniu formalino tirpalu santykiu 1:10.	1-40°C temperatūroje, rekomenduojamas kuo mažesnis poveikis temperatūros svyravimais, saulės spinduliais ir kt.	Transportuojama sandariame ir tinkamai pažymėtame konteineryje.	Taip		Mikroskopija	
LP04	Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno tyrimo objekto) makroskopinis ir histologinis tyrimas - IV lygis	6 d.d.	Transportavimo indas su tiriamu objektu, užpiltu 10% neutraliu buferiniu formalino tirpalu santykiu 1:10.	1-40°C temperatūroje, rekomenduojamas kuo mažesnis poveikis temperatūros svyravimais, saulės spinduliais ir kt.	Transportuojama sandariame ir tinkamai pažymėtame konteineryje.	Taip		Mikroskopija	
LP05	Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno tyrimo objekto) makroskopinis ir histologinis tyrimas - V lygis	6 d.d.	Transportavimo indas su tiriamu objektu, užpiltu 10% neutraliu buferiniu formalino tirpalu santykiu 1:10.	1-40°C temperatūroje, rekomenduojamas kuo mažesnis poveikis temperatūros svyravimais, saulės spinduliais ir kt.	Transportuojama sandariame ir tinkamai pažymėtame konteineryje.	Taip		Mikroskopija	
LP06	Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno tyrimo objekto) makroskopinis ir histologinis tyrimas - VI lygis	6 d.d.	Transportavimo indas su tiriamu objektu, užpiltu 10% neutraliu buferiniu formalino tirpalu santykiu 1:10.	1-40°C temperatūroje, rekomenduojamas kuo mažesnis poveikis temperatūros svyravimais, saulės spinduliais ir kt.	Transportuojama sandariame ir tinkamai pažymėtame konteineryje.	Taip		Mikroskopija	
LP07	Audinio dekalifikavimo procedūra	10 d.d.	Transportavimo indas su tiriamu objektu, užpiltu 10% neutraliu buferiniu formalino tirpalu santykiu 1:10.	1-40°C temperatūroje, rekomenduojamas kuo mažesnis poveikis temperatūros svyravimais, saulės spinduliais ir kt.	Transportuojama sandariame ir tinkamai pažymėtame konteineryje.	Taip			
LP16	Intraoperacinė (skubi) biopsija su šaldomaisiais pjūviais, vienas tyrimo objektas*	1 d.d.	Transportavimo indas su tiriamu objektu, nefiksuotu.	1-40°C temperatūroje, rekomenduojamas kuo mažesnis poveikis temperatūros svyravimais, saulės spinduliais ir kt.	Transportuojama sandariame ir tinkamai pažymėtame konteineryje. Ėminys priimamas tik V.Grybo g. 32A, Vilnius	Ne	VPC	Mikroskopija	Tyrimas priimamas iš anksto suderinus su laboratorija. Etiketėje atspariu cheminiams reagentams rašikliu užrašoma ar atspausdinama paciento/-ės vardas, pavardė, gimimo data
LP30	Imunohistocheminis tyrimas, kiekvienas antikūnis, išskyrus cMYC, ALK, CIntec PLUS, PD-L1*	10 d.d.	Biopsijos kasetė	1-40°C temperatūroje, rekomenduojamas kuo mažesnis poveikis temperatūros svyravimais, saulės spinduliais ir kt.	Transportuojama sandariame ir tinkamai pažymėtame konteineryje.	Ne	VPC		
LP31	Chromogeninės in-situ hibridizacijos tyrimas (EBER (EBSTEIN BAR viruso diagnostikai) ir kiti.)*	20 d.d.	Biopsijos kasetė	1-40°C temperatūroje, rekomenduojamas kuo mažesnis poveikis temperatūros svyravimais, saulės spinduliais ir kt.	Transportuojama sandariame ir tinkamai pažymėtame konteineryje.	Ne	VPC		

LP24	Imunohistocheminis CINtec PLUS	14 d.d.	Gamyklinis skystos terpės konteineris su mėginiu.	1-40°C temperatūroje, rekomenduojamas kuo mažesnis poveikis temperatūros svyravimais, saulės spinduliais ir kt.	Indai su skystais gabenami užspaudžiamame ar užklįjuojamame plastikiniame maišelyje	Ne	UAB "Patologijos diagnostika"	Imunohistocheminis, mikroskopija	Etiketėje atspariu cheminiams reagentams rašikliu užrašoma ar atspausdinama paciento/-ės vardas, pavardė, gimimo data
LP32	Biopsinės medžiagos IHC tyrimas	14 d.d.	Biopsijos kasetė	1-40°C temperatūroje, rekomenduojamas kuo mažesnis poveikis temperatūros svyravimais, saulės spinduliais ir kt.	Transportuojama sandariame ir tinkamai pažymėtame konteineryje.	Ne	VPC	Imunohistocheminis, mikroskopija	

Parengė:
Vyr. biomedicinos technologė Karolina Vilkytė
(vardas, pavardė, pareigos)

2026-09-16
(data)