



## Atmintinė. Magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) tyrimui

**Kai kuriems MRT tyrimams reikia tinkamai pasiruošti.**

**Susipažinkite su „Hila“ gydytojų rekomendacijomis prieš kai kuriuos MRT tyrimus.**

### **Prieš pilvo organų ir tulžies, kasos, kepenų lataukų MRT**

- Nevalgykite bent 4 val. prieš tyrimą.
- Į tyrimą atsineškite ne senesnius nei 3 mėn. kraujo serumo kreatinino tyrimo rezultatus.

### **Prieš prostatos MRT**

- Nevalgykite bent 4 val. prieš tyrimą.
- Iš vakaro ar kelias valandas prieš tyrimą pasinaudokite mikrokлизma (rekomenduos vaistinėje).
- Į tyrimą atsineškite ne senesnius nei 3 mėn. kraujo serumo kreatinino tyrimo rezultatus.

### **Prieš dubens organų MRT**

- Nevalgykite bent 4 val. prieš tyrimą.
- Nesišlapinkite bent 2 val. prieš tyrimą (jei bus tiriama šlapimo pūslė).
- Į tyrimą atsineškite ne senesnius nei 3 mėn. kraujo serumo kreatinino tyrimo rezultatus.

### **Prieš tiesiosios žarnos MRT**

- Nevalgykite kieto ir sunkiai virškinamo maisto 24 val. iki tyrimo.
- Pasinaudokite mikrokлизma iš vakaro arba kelias valandas prieš tyrimą (rekomenduos vaistinėje).
- Į tyrimą atsineškite ne senesnius nei 3 mėn. kraujo serumo kreatinino tyrimo rezultatus.

### **Prieš krūtų MRT**

Tyrimui rekomenduojame registruotis 2 ciklo savaitę (6–12 menstruacinio ciklo dieną).

- Nevalgykite bent 2 val. prieš tyrimą.
- Į tyrimą atsineškite ne senesnius nei 3 mėn. kraujo serumo kreatinino tyrimo rezultatus.

Dėmesio! Jei vartojate hormonus (gydymas, kontraceptikai, spiralė), MRT tyrimas gali būti neinformatyvus.

Dėl tyrimo tikslingumo pasitarkite su jį paskyrusiu gydytoju.



## Kontraindikacijos magnetinio rezonanso tyrimui:

- metaliniai implantai (kurių sudėtyje yra geležies, nikelio, kobalto);
- širdies stimulatorius, poodinis širdies defibriliatorius, insulino, morfijaus ir kitų vaistų pompos;
- metalinės kabutės po operacijų;
- smegenų skysčio drenas;
- dirbtiniai širdies vožtuvai arba kraujagyslių implantai (filtrai, kateteriai, stentai);
- akių, ausų, sąnarių arba galūnių implantai;
- metaliniai implantai, naudojami kaulų lūžiams gydyti;
- svetimkūniai organizme – skeveldros, kulkos ir kt.;
- bet koks kitas nepaminėtas elektroninis, mechaninis ar magnetinis implantas;
- uždarytų patalpų baimė;
- paciento masė, didesnė negu 150 kg;
- reliatyvi kontraindikacija – nėštumas (pirmos 12 sav.) ir laktacijos periodas.



Registracija tel.  
+370 698 00 000  
hila.lt



V. Grybo g. 32, Vilnius



I–V 7.00-20.00 val.  
VI 7.00-19.00 val.  
VII 9.00-15.00 val.